

Difs.

761.

2.

m

Medic

Mit mal lo

Schaeffer

592

DISSERTATIO INAUGVRALIS MEDICA
SISTENS

ANJHELMJNTICA
REGNI VEGETABILIS

QVAM

EX CONSENSV ET AVCTORITATE
GRATIOSAE FACVLTATIS MEDICAE

PRO

GRADV DOCTORIS

AD DIEM 1. NOVEMBR. MDCCLXXXIV

EXHIBET

A V C T O R


IOHANNES · SCHAEFFER

NORIBERGENSIS.



ALTDORFII

LITTERIS IOHANNIS PAVLLI MEYERI.



SACRI ROMANI IMPERII
LIBERAE AC PERILLVSTRIS
REIPVBLICAE
NORIBERGENSIS
S E N A T V I
SPLENDIDISSIMO
PERILLVSTRIBVS AC GENEROSISSIMIS
DOMINIS
DVVM VIRIS
TRIVM VIRIS
SEPTEM VIRIS
CONSVLIBVS
SENATORIBVS
PATRIAE PATRIBVS
OPTIMIS
DOMINIS AC MAECENATIBVS
GRATIOSISSIMIS

FORTVNATOS ET TRANQVILLOS
IN REGENDA REPVBICA SVCCESSVS
VALETVDINEM INTEGRAM

ET

VITAM LONGAEVAM
GENEROSISSIMARVM FAMILIARVM
SALVTEM PROSPERRIMAM

PIE APPRECATVRVS

HOC STVDIORVM SPECIMEN

D. D. D.

TANTORVM NOMINVM.

CULTOR OBSEQVENTISSIMVS

AVCTOR.



PRAEFATIO.

Quoad longissime potest mens mea respicere vestigia praeteriti temporis, in veterum scriptorum monumentis, inde usque repetens, interaneorum animalia video non solum tenerioribus, sed et aetate provectioribus principem et ad gignendos et ad deteriores efficiendos morbos, rationem extitisse. Ex quo factum est, ut medici, humanitate ducti,

vehementer inflammarentur, ut non deessent, quibus adversarios istos, corpus omnibus profecto cruciantes modis, profligarent, imo graviter iis adfectos quasi e mortis faucibus eriperent, et scientiae medicae adhuc maior inde adfulgeret lux et splendor. Verum enim vero tantum aberat, ut prospera aequabilisque valetudo, secundo vitae sine ulla offensione cursu exinde oriretur, ut potius omnium propemodum horum remediorum vim prorsus illuderent vermes, adeo, ut infirmi incredibili hac et paene divina, qua sanitatis beneficio fruimur, voluptate carere cogerentur. Res itaque diligentius tractari coeperat. Quum enim ea maximi momenti esset, et ad salutem totius generis humani pertinere videretur, accidit, ut medici, quo se verterent, nescientes, assidue captis experimentis, Materiae, ut dici solet, Medicae tantum huius generis medicamentorum cumulum adderent, ut vix ulla inveniri posset huius pars, quae maiori instructa esset copia. Ego vero, quum iam in eo essem, ut mihi ad differendum materiam fumerem, operae pretium me facturum esse credidi, si, quantum id quidem in me positum erit,

erit, omnia, quae anthelmintica et praestantiora et leviora in monumentis medicorum partim dispersa, partim adhuc neglecta iacerent, paulo adcuratius investigarem, eaque, servato ordine, collecta publici iuris facerem. Atque ego quidem parum hic laudis captandum esse duco e labore tam parvo; non ingratum tamen hunc ipsum, nec inutilem fore confido: quippe quem a me ipso non absque voluptate et utilitate defluxisse confiteor.

Constitueram quidem initio, brevi antea facta de eo, quo modo generentur hi hospites infesti in corpore humano, praefatione, ad tractationem earum rerum, quas hac in Dissertatione recensere animo mihi proposui, accedere; nisi magnorum Virorum Venerab. GOEZ et Cl. BLOCH, quorum industria in amplificanda augendave historia rerum naturae non satis laudari digne potest, egregii libri de vermium in animalium interaneis viventium ortu, natura figuraeque conscripti in manus venissent, meque de fixa iam statutaque sententia deduxissent. Etenim Duum viri hi omnia flagranti studio summaque animi contentione, ita, ut nulla pars ab iis praetermissa videa-

tur, tractarunt, omnemque infimul de vermium in corpore animali primordio errorem amputare, falsarumque opinionum, quibus hucusque delectabamur, fibras evellere, feminaque extinguere studuerunt. Rebus itaque sese ita habentibus, et quum nihil, saltem parum novi ac inauditi me dicturum esse non solum suspicarer, sed et plane cernerem, eos, quorum haec omnia clare nosse, aut quorum sententiam ex contrariis diversisque inter se pugnantibus opinionibus conflata, certiore melioremque reddere interest, ad ipsos indicatos fontes, e quibus enarratio rerum uberrima hauriri potest, relegabimus.

His praemissis pauca quaedam de distributione anthelminticorum ipsa differere fert animus. De quibus autem quoniam omnis disputatio futura est, placeat antea definire, quid nobis sit anthelminthicum, ut appareat, quid sit id, de quo disputetur. Est autem anthelminticum nihil aliud, nisi medicamentum, quod corpori, sive interne sive externe adplicatum, interaneorum vermes vel expellit, vel enecat, vel etiam utrumque simul efficit. Posita hac definitione dividam ego omnia helmintagoga in duas classes.

ses. Quorum unam vermes *expellentia*, alteram vero *enecantia* continere dico. Quaedam enim expellentia sunt, quae aut draastica sua virtute, aut vi mechanica, aut amaritie, graveolentia et fragrantia sua tollunt vermes, aut quae a vermibus ob dulcedinem suam, quam in deliciis habere creduntur, adpetita, eos ad intestina usque crassa adlectos evocant. Ex quo vel maxime intelligi potest, cur clysteres e lacte vel dulcibus parati iniiciantur, quo vermes nimirum ad inferiora adliciantur et educantur. Quaedam vero vermes sola interficiunt, quibus potissimum cathartica subiungenda sunt, ut vermes mortui educantur. Atque etiam praeter has tertia est classis, continens ea, quae *expellentia* aequae ac *occidentia* dici queunt; propterea quod neque solum educunt, neque solum interimunt, sed, si dentur, utrumque simul faciunt. Est et alia adhuc distributio helminticorum. Nam et *simplicia* quaedam dicuntur et *composita*. De prioribus nobis est praecipue hac Dissertatione explicandum; de posterioribus vero nil nobis quasi negotii. Etiam dividuntur in *externa* et *interna*.

Perlustrando Catalogum nostrum forsan invenies, quae votis minus respondeant. Credo. Rerum copia presso, temporisque angustis incluso mihi non contigit, omnium, quae adduxi, vires experi-ri; sed in isto genere cum multorum, tum magnorum virorum auctoritatem me sequi oportuit. Illud etiam tacitus praeterire non possum, nec fas esse duco, non omnibus eadem auxilia convenire. Notum enim est exploratumque, alia atque alia fumos auctores quasi sola commendasse, prouti cuique vermes cesserant. Oportet nos itaque, ubi aliquid non statim eodem modo respondet, non magis attendere auctorem, quam aegrum; sed experi-aliud atque aliud. Neque etiam ego sum is, qui tantum mihi sumam, ut omnia, quae nos circumfluunt anthelmintica, enumerasse mihi persuadeam, ut maiorem potius copiam adhuc invenire me potuisse credam, si mihi plus otii minorque festinandi necessitas fuisset.

Restat, ut, quanta maxima fieri potest brevitate, dicam de circumspectione, qua in exhibendis anthelminticis sub ipsis paroxysmis verminosis

gra-

gravioribus utendum fit. Idque eo utilius fore arbitror, quo minus in eo collocarint operam ac diligentiam suam auctores. Permultos esse nimirum intelligo, qui eam animo imbibant sententiam, ut in quolibet symptomate verminoso, omni posthabita ratione induciarum subinde paciscendarum, statim de expellendis hostibus cogitandum esse iudicent. A quibus ego vehementer dissentio, adeo, ut frequenter abstinendum esse ab ipsa methodo expulforia, eligendamque potius symptomaticam existinem. Est enim perspicuum, quam difficile sit, vermes expellere, si convulsiones, epilepsiae aliaque symptomata urgent, ubi vermes scilicet convellicatione et irritatione intestinorum tubum spastice constringunt, sicque exitum sibi claudunt. In his si consueta methodo obviam ire velis, nec mitigantibus et antispasmodicis remediis nervorum tumultum sedare studeas, fane mirum in modum augebis symptomata, nec metam attinges tibi propositam. Data enim anthelmintica, quae cum vermes, tum intestina utplurimum graviter irritant, deteriora reddunt symptomata. Ex his elucet, non statim purgantia vel alia
acria

acria et calefacientia propinare medicum oportere, sed potissimum symptomata magis urgentia respicere, eaque adhibere, quae symptomatibus insimul respondeant. Sic, credo, vermibus, quos comitantur convulsiones, opium, asam foetidam, radicem Valerianae etc. opponere maxime convenit. Quae omnia relaxant spasmos atque etiam vermes simul expellunt. Sed satis de hoc — Plura praefari magnitudo voluminis prohibet; ad propositum potius veniemus et in hac recenserebimus Dissertatione Anthelmintica regni vegetabilis.





CLASSIS I.

MONANDRIA.

MONOGYNIA.

AMOMVM.

1. **A.** *Zingiber*. RHEED. mal. 11. p. 21. t. 12. JACQ.
hort. t. 75.

LOC. India orientalis; nunc Iamaica. *Perernis, fera.*

PHARM. ZINGIBERIS COMMVNIS Radix 3j
condita cum vel s. Brodio.

ALBI Radix 3j *optima,*
condita cum vel sine Brodio.


QUALITAS: acris, aromatica, fervida, subfragrans.
Culinaris.

VIS: calefaciens, (*recens* eccoprotica) stomachica, sti-
mulans.


2. **A.** *Cardamomum*. RHEED. mal. 11. p. 9. t. 6.

LOC.

2. [*A. C. lumbricum latum* pellit auctore DIOSCORIDE,]



LOC. Malabaria. Zeylona. *Perennis, peregrina.*

PHARM. CARDAMOMI MINORIS (*fructus*) non
excorticatus, excorticatus, Semina .

QUAL. praecedentis. *Culinaris.*

VIS: stimulan, nervina.

3. A. *Granum paradisi.* RHEED. mal. II. t. 6. f. 4.

LOC. Madagascar, Guinea, Zeylona, in umbrosis
uliginosis ad radices montium. *Perenn. peregr.*

PHARM. PARADISI GRANA (Semina).

QUAL. antecedentis, sed acerrima. *Rarior.*

VIS: stimulan, calefaciens.

COSTVS.

4. C. *arabicus.* RHEED. mal. II. pag. 15. t. 8. JACQ.
amer. I. tab. I.

LOC. Malabaria, Zeylona, Brasilia, Surinamum.

Perennis, fera.

PHARM. COSTI DVLCIS Radix 3ß.

ARABICI Radix 3ß

QUAL. amara, aromatica, acris, suaveolens. *Rarior.*

VIS: stimulan, calefaciens, stomachica.

MARANTA.


5. M. *Galanga.* RVMPH. amb. 5. p. 142. t. 63.

LOC. India orientalis, Philippinae. *Perennis, fera.*

PHARM.

4. [Pellit lumbricum latum cum aqua, ob amaritiam, quae illi inest.

RAII hist. pl. L. XXIII. c. XVI.]



PHARM. GALANGAE MAIORIS Radix (*Ingratior*)

MINOR. Radix (*fortior*)

QUAL. acris, aromatica, fragrans. *Praestans.*

VIS: stimulans, stomachica.

KAEMPFERIA.

6. K. *rotunda*. RHEED. mal. 11. p. 17. t. 9.

LOC. Zeylona, Malabaria. *Perennis, peregrina.*

PHARM. ZEDOARIAE LONGAE Radix gr. 5—10.

Essent. ∇ , $\curvearrowright$, $\circ\circ$, Semina.

QUAL. subacris, aromatica, amaricans, debilis fragrans.

Frequens, praestans.

VIS: stimulans, stomachica.

CLASSIS II.

DIANDRIA.

MONOGYNIA.

OLEA.

7. O. *europaea*. BLAKW. t. 199. LEHRS Diff. de Oliv.


c. fig.

LOC.

6. [CARTHEVS. Fund. Mat. Med. Sect. XII. c. III. §. 3.]

7. [Ex antiquioribus medicis DIOSCORIDES olei virtutem in expellendis vermibus iam perspectam habebat exploratamque. CAEL.

AVRELIANVS item id maxime extollit, ac vel solum vel aqua commixtum, ingurgitasse ad interaneorum vermes expellendos suffectu-



LOC. Hispania, Gallia, Italia (coelo temperato).

Arbor, mansueta, sterilis.

PHARM. OLIVAE (fructus) *conditae*. Ol.

QUAL. $\circ\circ$ pingue, blandum, insipidum, inodorum;
Condit. austera. Culinaris.

VIS: $\circ\circ$ obtundens, emolliens, leniens, relaxans. *Con-*
dit. tonica, stomachica.

GRATIOLA.

8. *G. officinalis*. OED. *Flor. dan.* t. 363.

LOC. Lusatia, Gallia, et australioris Europae hu-
midiuscula. *Perennis, palustris, mansueta.*

PHARM. GRATIOLAE Herba recent. 3j. in decoct.
aquos. a 3i℥ ad 3ij. Extr. 3℥ Syr.

QUAL. amara, nauseosa. *Eximia, cauta.*

VIS: purgans, emetica, hydragoga.


9. *G.*

fecturum esse docet. Atque etiam CELSVS pueris, lumbricis teretibus obnoxiiis, in alvum iniectum utile iudicavit. Cuius duo aut tria cochlearia uno die sumpsisse, sufficient. Neque alienum videtur, ascaridibus exercitatis enematibus, ex hoc oleo iniectis, succurrere, siquidem immortal. BOERHAAVIO, foeminam quandam ascaridibus vehementer vexatam, oleo quam diligentissime hausto, et clysteribus ex eodem adhibitis, brevi ad sanitatem reduxisse contigit. Animadvertere autem oportet, quodlibet oleum vermibus esse infestum.]

8. [ACAD. DE SCIENCES l'ann. 1705. p. 246.

ANGELVS SALA Essent. veget. Sect. V. c. 9. p. 158. sq.

BALDINGERS *neues Magazin für Aerzte* IV Bands IV Stück.
1782. p. 330.]



9. *G. peruviana*. FEWILL. peruv. 3. t. 47.

LOC. Peru.

QUAL. antecedentis.

VIS: purgans.

VERBENA.

10. *V. officinalis*. OED. *Flor. dan.* t. 628.

LOC. Europa australior, Scania.

Annua, cicur.

PHARM. VERBENAE Herba, ▽.

QUAL. subinsipida, inodora.

Exoleta.

VIS: adstringens.

SALVIA.

11. *S. officinalis*. BLAKW. t. 10.

LOC. Europa australis.

Perennis, olitoria.

PHARM. SALVIAE Herba, ▽, ♀, ♂, Fl. Sem.

QUAL. suavem odorem spirans, amaricans. *Frequens, praestans.*

VIS: adstringens, tonica, stomachica, unde et sudoribus nimis opitulatur.

12. *S. SCLAREA*. REGNAULT bot. DOD. pempt. 292.

LOC. Syria, Italia.

Biennis, olitoria, mansueta.

PHARM. SCLAREAE (Gallitrichi) Herba.

QUAL. spirans.

Rarior.


VIS: fortior *S. officinali*, stimulans.

TRI-

9. [*Gratiola peruviana*, infusa aqua, Indiani frequenter uti solent, quando vermium cruciatu afficiuntur. FEWILL.]

10. [MONARDI Lib. 3. simpl. Medicam. ex novo orbe delat. cap. de *Verbena*.]

11. [WEDELIVS, VAN SWIETEN, MELLIN, IOHN HILL.]



TRIGNIA.

PIPER.

13. *P. nigrum*. PLVCK. alm. 297. t. 437. f. 1. RHEED.
mal. 7. p. 23. t. 12.

LOC. India orientalis.

Frutex, peregrinus.

PHARM. PIPERIS NIGRI Fructus, $\circ\circ$, $\odot$.

ALBI Fructus.

QUAL. acris, aromatica, fervida.

Culinaris.

VIS: stimulans, stomachica.

14. *P. longum*. RHEED. mal. 7. p. 27. t. 14.

LOC. India orientalis.

Frutex, peregrinus.

PHARM. PIPERIS LONGI Fructus.

QUAL. praecedentis.

VIS: _____

15. *P. CVBEBA*. SUPPL. pl. 90.

LOC. Iava.

PHARM. CVBEBAE Fructus, $\circ\circ$.

QUAL. praecedentis.

VIS: _____

CLAS-

13. [ROSENSTEIN von den Kinderkrankheiten, Abschn. XXII.
pag. 551.]

CLASSIS III.

TRIANDRIA.

MONOGYNIA.

VALERIANA.

16. *V. officinalis*. OED. DAN. 570.

Locvs: Europae prata et nemora paludosa.

Perennis, vulgaris.

PHARM. Valerianae sylvestr. (minoris) rad. ʒij. Extr.

QUAL. hircofo - felina, amaricans. *Praestans.*

VIS: purgans, antepileptica, ophthalmica.

17. *V. phu.* BLAKW. t. 250. REGN. bot.

LOC. Alsatia, Silesia.

Perennis.

PHARM. PHV (Valer. mai.) rad. herba.

QUAL. antecedenti amarior.

Exoleta.

VIS: antecedentis.

18. *V. celtica*. CLVS. pann. 514. 515.

LOC. Helvetia, Styria, Liguria, Genua, Alpes.

Perennis, peregrina.

PHARM. SPICAE CELTICAE Rad. Flores.


B 2

QUAL.

16. [III. L. B. a STOERCK eam excellenter ad fugandos vermes facere observavit.

Mem. de l'Academie des sciences. 1706. pag. 430.

v. SWIETENII Comment. T. IV. p. 728. Edit. Hildburgh.]



QVAL. fragrans, acris, aromatica, amaricans. *Rarior.*
VIS : stomachica.

IRIS.

19. *I. germanica.* BLAKW. t. 69.

LOC. Germaniae, Helvetiae edita. *Cicur.*

PHARM. IREOS NOSTRATIS Rad. foccula ob-
soleta.

QVAL. odor subnauseosus, sapor leviter amaricans,
acris. *Heroica.*

VIS : rec. purgans, hydragoga, subemetica.

20. *I. Pseudo-acorus.* OED. DAN. t. 494.

LOC. Europa ad ripas paludum, fossarum.

Perennis, vulgatissima.

PHARM. ACORI PALVSTRIS Radix.

QVAL. insipida, substyptica. *Rarior.*

VIS : hydragoga.

D I G N I A.

SACCHARVM.

21. *S. officinarum.* SLOAN. iam. 31. hist. 1. pag. 108.


t. 66. RVMPH. amb. 5. p. 186. t. 74. f. 1.

LOC. Indiae utriusque loca inundata. *Perennis, fera.*

PHARM.

20. [ETMVLLERVS lumbricos inde deiectos vidit — teste SPIEL-
MANNO.]

21. [vid. REDI observ. de Animal. vivis in Corp. anim. viventium
pag. 165.]



PHARM. *Saccharum canariense*, candidum, album, rubrum, Farinaceum, album, griseum, Penidium, Perlatum, Rubrum, Syrupus.

QUAL. dulcissima, inodora, mitissima. *Culinaris, usitatissima.*

VIS: saponacea, edulcorans, relaxans, expectorans.

BROMVS.

22. B. *Sterilis*. RETZ fasc. I. obs. pag. II. LEERS Herborn. n. 83. t. II. f. 4.

LOC. Europae australioris agri, sylvae, ad vias.

PHARM.

QUAL. et VIS:

TRITICVM.

23. T. *repens*. SCHREBER Gram. I. p. 24. t. 26.

LOC. Europae nostrae ruderata. *Perenne, vulgatissimum.*


PHARM. GRAMINIS Radix, ▽.

QUAL. dulcescens.

Vsitata.

VIS: aperiens, mundificans.

22. [Adversus infantum vermes tanquam singulare auxilium radicis in vino albo decoctum diebus aliquot continuis potum commendat TRAGVS. vid. RAI hist. pl. L. XXII. cap. X. A. 5.]



CLASSIS IV.

TETRANDRIA.

MONOGYNIA.

COVTOVBEA.

24. *C. spicata*. AVBLET hist. des pl. de la Guiane p. 72.
t. 27.

LOC. Guiana ad rivulos.

Annua.

QVAL. amara.

VIS: tonica, stomachica.

25. *C. ramosa*. AVBL. guian. 74. t. 28.

LOC. idem ibidem.

QVAL. et VIS: eadem.

DORSTENIA.

26. *D. Contrayerva*. BLAKW. t. 579. HOVST. act. n. 421.
f. 1. PLUM. gen. 29. ic. 119.

LOC. Peru, Mexico, Vera crux, Ins. Vincentii.

Perennis, peregrina.

PHARM. CONTRAYERVAE Radix.


QVAL. aromatica, subfragrans, amaricans.

*Vsitata,
praeftans.*

VIS: adstringens, stomachica.

CLAS-

26. [CARTHEVS. Fund. Mat. Med. S. XIII. c. 4. §. 3.]



CLASSIS V.

PENTANDRIA.

MONOGYNIA.

ANCHUSA.

- 27^a. *A. officinalis* cum HYSSOPO et NASTURTIO
pota latos ventris lumbricos excutit, refe-
rente DIOSCORIDE.

CYCLAMEN.

- 27^b. *C. europaeum*. JACQ. austr. t. 401.

LOC. Asiae, Pannoniae, Hungaricae, Austriae,
Tartariae sicca umbrosa nemorosa. *Perenne,*
mansuet.

PHARM. CYCLAMINIS Radix 3j.

QUAL. mucilaginosa, tum acris, fervida, amaricans.

Rarior.

VIS: purgans, drastica; Externe resolvens, anthel-
mintica.

MENYANTHES.

28. *M. trifoliata*. GMEL. fib. 4. t. 97. OED. FL. DAN.
t. 541.

LOC. Europae paludes.

Perennis, vulgaris.

B 4

PHARM.

28. [CARTHEVS. Fund. Mat. Med. Sect. IX. c. 3. §. 5.]



PHARM. TRIFOLII AQUATICI herb. Conserva,
Essent. Ω .

QUAL. amarissima.

Praestans.

VIS: tonica, saponacea, stomachica, subeccoprotica.

SPIGELIA.

29. *S. anthelmia*. AMOEN. acad. 5. p. 133. t. 2. BROWN
iam. 156. t. 37. f. 3. PET. gaz. t. 59. f. 10.

LOC. Caienna, Brasilia.

annua, fera.

PHARM. SPIGELIAE herba.


QUAL. tetra, foetida.

Rarior.

VIS: expellens.

30. *S.*

29. [S. A. summo in honore semper fuit apud medicos, adeo, ut longe ceteris excellere anthelminticis existimaretur, imprimis, ubi febres ac convulsiones comites se vermibus adiungere, plurimum boni peperisse reperta est. Qua *Nigri*, qui incolas insularum Britannicarum eius usum docuerunt, nil habent praestantius ac frequentius, quo utantur, mirasque eam semper apud illos exseruisse vires cognitum est. De eius igitur laude neque hic locus est, ut multa dicantur, neque plura tamen dici possunt, quam b. LINNAEI Amoen. acad. Vol. 5. T. 2. continet. Namque idem ille auctor confitetur, se nunquam virtutis expertem eam deprehendisse, modo si spes salutis affulserat; quid? quod multum exinde hausisse utilitatis, ubi iam de salute pertimescere coeperat; simulque addit, in id omni studio incumbendum esse medicis, ut tam efficax remedium contra vermes in officinas introducatur. Quae tamen circumspectione atque prudentia adhibenda erit, cavendumque, ne corpus detrimenti quid capiat, idque adversae valetudinis praesidia consumant; siquidem nimia dosis, confirmante b. LINNAEO, vertiginem excitat cum spasmodis supra, infra et intra ipsos oculos. Ea vero symptomata vel sponte evanescent, vel aromatibus, croco aut spirituosius, removentur. Cel. VAN SWIETEN



30. *S. marylandica*. HOPE Act. Edinb. 3. ann. 1771.

p. 151. t. 1. CATESB. carol. 2. p. 78. t. 78.

LOC. Virginia, Marylandia, Carolina. *Fruticans*


perennis.

B 5

PHARM.

TEN in Comment. in Boerh. T. 4. p. 737. eandem amplectitur sententiam, affirmatque, hanc plantam corpori admodum esse inimicam; eamque ob causam non temere ea utendum esse censemus. Methodus vero hanc praeparandi medicinam haec erit: Rec. Hb. Spigeliae Mij. Coq. in aq. fontan. ℥ij. Col. exhibe ℥j. cui adde Sacchar. alb. q. s. ad gratiam. S. Dentur circiter ℥iv. aetate provectoribus pro dosi prima, et circiter ℥ij. l. iij. quovis sexhorio consequuturo, si ratio id permiserit. Sed gracilioribus repetatur solum quavis hora 10 vel 12: hoc continuetur per spatium 36. l. 48. horarum, tum dosis gemina iteretur; et praestito dosi sumtae effectu, iuветur Rhabarbaro vel alio quodam nobili purgante. vid. BROCKLESBY Oec. et med. obs. pag. 282. sq. Ill. MURRAY Appar. med. T. 1. p. 380.]

30. [SPIGELIA MARYLANDICA in America boreali ob eximias suas vires, quibus pollere dicitur, tantis laudibus effloruit, ut plurimum ANTHELMIAE praestare credita fuerit. Cel. BERGIVS iam pridem maluerat, ut Spigeliae herba e S. MARYLANDICA desumeretur; utpote quae ex eius sententia Anthelmia viribus longe superior est. Et quidem, ut de aliis auctoribus nihil dicam, extat in PHIL. TRANSACT. T. 1. Edinb. edit. narratio de natura eius et insigni ab illa praestito iuvamine. Praescribitur vel in pulvere, vel etiam in infuso aquoso. Dosis adulto herb. ℥ij, in infuso, bis de die. D. IOHN LINING radicem in forma pulveris praestantiorē putat, puerisque triennibus gr. xii. vel in infuso ℥j, hac dosi mane et vesperi per aliquot dies repetita suffectura esse. Opera vero danda, ne in exhibenda hac medicina liberalior fuisse videare; enimvero, teste Cel. BERGIO, pupillae dilatationem efficit, in nimia dosi sumta. vid. M. M. p. 95. T. 1.]



PHARM. SPIGELIAE MARYLANDICAE Radix.

QUAL. praecedentis.

VIS. praecedentis, sed praestantior.

OPHIORRHIZA.

31. *O. mungos.* MAT. MED. p. 59. t. 1.

LOC. Zeylona, Iava, Sumatra. *Perennis, peregrina.*

PHARM. SERPENTVM Radix.

QUAL. amarissima.

Exoleta, praestans.

VIS : expellens.

CONVOLVULVS.

32. *C. Scammonia.* MORIS. hist. 2. p. 12. f. 1. t. 3.

f. 5. MILL. dict. t. 102.

LOC. Syria, Myfia, Cappadocia per Smyrnam.

Perennis, peregrina.


PHARM. SCAMMONIVM CRVDVM gr. vj. Diacrydium ꝯß. Resina ꝯß.

QUAL. acri — amaricans, nauseosa, gummosa — resinosa.

VIS :

31. [Quid efficere valeat haec radix in debellandis omnis generis ver-
mibus BONTIVS in hist. nat. et Med. Ind. Orient. Amst. 1658.
expertus esse videtur; de qua re plura legi velim in b. LINNAEI
Dissertatione *Lignum Colubrinum* inscripta, quam amoenitatibus
suis academicis Vol. 2. inferendam curavit, ubi simul graviter mo-
lestaque fert, quod in huius locum frustula ligni cuiusdam arbo-
ris longe diversissimae (*Strychnos colubrina*) in pharmacopoliis
europaeis substituuntur.]

32. [ROSENSTEIN *von den Kinderkrankheiten Abschn. XXII. p. 546.*
v. SWIETEN *Comment. T. IV. p. 737.*]



VIS: purgans, heroica, crudum calcar, Resina laudabilis, Diacryd. optimum.

33. *C. Turpethum*. BLAKW. t. 397. HERM. lugd. 177. t. 178. 179.

LOC. Zeylona, Malabaria. *Perennis, peregrina.*

PHARM. TVRPETHI Radix. 3℔. Extr.

QUAL. gummosa, subinsipido — acris, nauseosa.

Rarior, praestans.

VIS: purgans, hydragoga.

34. *C. Ialappa*.

LOC. Mexico, Vera crux. *Perennis, peregrina.*

PHARM. IALAPPAE Rad. 3℔. Extr. ℥j. Refin. 3℔.

QUALITAS: nauseosa, acris odore et sapore.


Trita, heroica.

VIS: purgans, hydragoga. Resina calcar purgantis.

CIN-

33. [C. T. ingreditur species diaturbith. c. rhab. quae vermibus destinari solent. Post mercurium enim nihil fortius illos expellit, quam hae species, quae ad 3℔ ad 3j in formam morsulorum, ope sacchari redactae, propinantur, dicente IVNKERO m. m. pag. 59. Puellae annum VI agenti, ubi vermium suspicio mentem subibat, haec praescripsi: Rec. Turpeth. rad. pulv. ℥ij Aethiop. min. ℥j Syr. e Cich. c. Rheo 3j M. f. Elect. D. S. duo Cochlearia minora mane danda. Sumta hac medicina lumbrici magna copia exierunt.]

34. [vid. APPEND. ad pharm. Edinb. p. 278. Cel. SELLE Med. clinic. p. 623. VAN SWIETEN Comment. T. IV. p. 737.]



CINCHONA.

35. *C. officinalis*. L. PFLANZENSYST. I. p. 258. t. 6.
f. 1. ZORN. ic. t. 292.

LOC. Loxa Peruviae.

Arbor, peregrina.

PHARM. CHINAE cortex 3j. Eff. Extr.

QUAL. tenacissime amara, carnes amaritie inficiens.

Trita, beroica.

VIS: tonica, adstringens, roborans, sublaxans.

COFFEA.

36. *C. arabica*. AMOEN. ACAD. 6. pag. 160. t. 160.
IVSS. act. 1713. p. 388. t. 7. BLAKW. t. 337.

LOC. Arabia felix, Aethiopia.

Arbor, fera.

PHARM. COFFEE SEMINA, ustulata.

QUAL. usta empyreumatica.

Culinaris.

VIS: excitans, pellens, carminativa.

NICOTIANA.

37. *N. Tabacum*. BLAKW. t. 146.

LOC. America.

Annua, mansueta.

PHARM. Tabaci herb. Pulvis, O°O , Extr. gr. ij. Syr.
3iij. Sem.

QUAL. nauseosa, acris.

Trita, praestans.

VIS: narcotica, emetica, purgans, phthiriaca.

CAPSI-

35. [vid. MEDICVS Geschichte periodischer Krankheiten p. 31. KLEIN
Select. medicam. rational. p. 55.]

37. [vid. VAN DOEVEREN von den Würmern p. 312. et DESPOR-
TES histoire des maladies de St. Dominique T. 1. Paris. 1773.
12. p. 141. MED. OBS. and INQUIRIES Vol. 2. p. 307. et
MED. TRANSACT. Vol. 1. p. 45.]



CAPSICVM.

38. *C. annum.* BLAKW. t. 129. RHEED. mal. 2. p. t. 35.
 LOC. Brasilia, Mexico, Barbados. *Annua, sub-*
mansueta.
 PHARM. PIPERIS INDICI fructus (Semina).
 QVAL. acris, septica. *Culinaris Indis, eximia, rarior.*
 VIS: rubefaciens, stimulan.

STRYCHNOS.


39. *S. Nux Vomica.* BLAKW. t. 395. RHEED. mal. 1.
 p. 67. t. 37.
 LOC. Malabaria, Zeylonia. *Arbor, peregrina.*
 PHARM. VOMICAE NVX, ʒʒ.
 QVAL. amara, virofa. *Rarior, cauta.*
 VIS: emetica, pellens.
40. *S. colubrina.* RHEED. mal. 7. p. 10. t. 5. BLAKW.
 t. 403. RVMPH. amb. 2. c. 46. t. 37.
 LOC. Malabaria, Timor, Solor. *Arbor, peregr.*
 PHARM. COLVBRINI VVLGARIS Lign. (radi-
 cis) ʒʒ.
 QVAL. suspecta, acris, amarissima. *Exoleta, cauta.*
 VIS: emetica, pellens, fatuans.

IGNATIA.

41. *I. amara,* SVPL. pl. 149.
 LOC. India, Insulae Philippinae. *Arbor, peregrina.*
 PHARM.

38. [CELS. lib. IV. c. XVII.]

40. [CARTHEVS. Mat. Med. S. XII. c. XXI. §. 9.]



PHARM. IGNATII FABAE.

QUAL. nuclei amarissima, nauseosa, fol. minus amara.
Rarior, heroica.

VIS: tonica, pellens, narcotica.

CHIRONIA.

42. C. *Centaurium*. BLAKW. t. 452. OED. DAN. t. 617.

LOC. Europae humidiuscula. *Annua, vulgaris.*

PHARM. CENTAVRII MINORIS herb. (summitat.
 flor.) Extr. ∇ , $\cup$, $\ominus$; Flor. Conserva.

QUAL. amarissima. *Trita, praestans.*

VIS: balsamica, tonica, stomachica.


CORDIA.

43. C. *Myxa*. DILL. elth. 340. t. 255. COMM. hort.

I. p. 139. t. 72. BLAKW. t. 398. RHEED.
 mal.

42. [Si cui forte mirum videatur, quid tandem sit causae, quod ego
 C. ad *Chironiae* genus retulerim; is, si me vel maxime auctori-
 tatem magni illius SCHREBERI, cuius praecepta imbibisse ma-
 gnopere laetor, sequutum esse, cognoverit, simul et id, quod
 feci, probabit, et me, si aliter fecissem, iustam doctorum re-
 prehensionem nullo modo effugere potuisse existimabit. — WE-
 DELIVS et LEDELIVS, qui de hac planta differuerunt, C. Cent.
 magnis laudibus extulerunt in vermium affectibus. In clysteribus
 adhibita ventrem fortiter movet, atque ascaridum colluviam ex-
 tinguit.]

43. [Quum aliquot auctores confirment, lumbricos myxis summo-
 pere delectari; SOLENANDER decoctum *Sebesten* pro Clystere laudat
 ad haec animalia adlicienda et evocanda.]



mal. 4. p. 77. t. 37. PLVK. alm. 306. t. 217.
f. 3.

LOC. Aegyptus, Malabaria.

Arbor, fera.

PHARM. SEBESTEN, (Drupa).

QVAL. mucilaginoso, dulcis.

VIS : nutriens, lubricans, eccoprotica.

VITIS.

44. V. *vinifera*. BLAKW. t. 154.

LOC. Orbis quatuor partes temperatae.

Frutex, mansueta.

PHARM. VITIS folia. Agrestae Syrupus. Passulae
maiores, longae. Corinthiacae, pulpa, lo-
hoc. Vinum album, Rhenanum rubrum,

☿, ☿.

QVAL. Fol. acidula, substyptica. Passul. acidulo-dul-
cis.

Trita, eximia.

VIS : Fol. subadstringens. Passul. nutriens, sublaxans,
lubricans.

NERIVM.


45. N. *Antidysentericum*. RHEED. mal. 1. p. 85. t. 47.

BVRM. Zeyl. 176. t. 77.

LOC. Malabaria, Zeylona, Russia. *Frutex, peregrinus.*

PHARM.

44. [ANDRY de la generation des vers dans le corps de l'homme. à
Paris 1700. p. 244. BAGLIV. oper. omnia. pag. 699. VAN
SWIETEN narrat in febre Castrensi verminosa vinum et in pri-
mis serum lactis vinosum profuisse, dum larga copia potabatur,
Vid. eius Comment. T. IV, p. 735.]



PHARM. Profluvii Cortex.

QUAL. lactescens, acris.

Ignota.

VIS:

ECHYTES.

46. E. *Suberecta*. JACQ. amer. pict. p. 21. t. 33.

LOC. Insulae Caribaeae.

Frutex, peregr.

PHARM. SVCCVS RECENS.

QUAL. lactescens, acerrima.

VIS: emetica, draastica, corrosiva, venenata.

DIGNIA.

ASCLEPIAS.

47. A. *Vincetoxicum*. BLAKW. t. 96. MILL. dict. n. 1.

icon. t. 53. JACQ. misc. austr. T. 1. t. 1. f. 5.

pag. 17.

LOC. Europae arida, praesertim Gothlandiae.

Perennis, frequens.

PHARM. HIRVNDINARIAE Radix 3j; hb. ∇ , $\circ^{\circ}$.

QUAL. lactescens, subvenenata.

Trita, dubia.

VIS: expellens.

CHENOPODIVM.


48. C. *botrys*. ZORN. ic. t. 225.

LOC. Calabria, Hetruria, Narbona, (Russia).

Annua, cicur.

PHARM.

46. [Nimis violentam eam iudicat virtutis eius anthelminticae testis SLOANEVS.]



PHARM. BOTRYOS herba, Semina.

QUAL. fragrans, graviuscula. *Rarior, praestans.*

VIS: resolvens, pellens, carminativa.

49. *C. ambrosioides*. MORIS. hist. 2. p. 605. f. 5. t. 35.
f. 8.

LOC. Mexico, Lusitania.

Annua.

PHARM.

QUAL. praecedentis.

VIS: praecedentis.

50. *C. anthelminticum*. DILL. elth. 77. t. 66. t. 76.

LOC. Pennsylvania, Bonaria.

Perennis.

PHARM. CHENOP. ANTHELM. Sem. $\frac{3}{4}$ j.

QUAL. graveolenti fragrans.

Eximia, inusitata.

VIS: anthelmintica.

GENTIANA.

51. *G. lutea*. MILL. icon. 139. f. 2.

LOC. Alpes Norvegicae, Helveticae, Apenninae,
Silesiaca, Austriaca, Pyrenaea, Tridentina.

Perennis, mansueta.


PHARM. GENTIANAE RUBRAE rad. Ess. Extr.

QUAL.

49. [Quoniam *C. ambrosioides* passim frequentius adhibetur Botryo, ob hanc causam addendum esse arbitrati sumus.]

50. [Semina *C. anthelm.* in Pennsylvania et Nevv-Jersey inter certiora anthelmintica locum sibi vendicarunt, ac praecipue infantibus offeruntur. KALM. T. 2. p. 305.]

51. [CARTHEVS. fund. Mat. Med. Sect. IX. c. 3. §. 5.]



QVAL. amarissima, lutea.

Trita, praestans.

VIS: tonica, stomachica.

52. *G. Amarella.* FL. DAN. t. 328. GESN. fasc. 2.

p. 45. t. 21. f. 87.

LOC. Europae prata ficca.

Annua, vulgaris.

PHARM. GENTIANELLAE herba.

QVAL. amara.

VIS: balsamica, tonica.

53. *G. cruciata.* JACQ. austr. t. 372.

LOC. Pannoniae, Apenninorum, Helvetiae montosa
aprica, sterilia, ad vias. *Perennis.*

PHARM. GENTIANAE CRUCIATAE Radix.

QVAL. amara.

VIS: tonica.

DAVCVS.

54. *D. Carota.* BLAKW. t. 546. OED. DAN. 723.

LOC. Europae campi exaridi.

Biennis, cicur.

PHARM. DAVCI SYLVESTRIS Semina.

SATIVI (radix) Semina.


QVAL. rad. dulcescens, leniter aromatica, fragrans.

Trita.

VIS: rad. diluens, aperiens, anthelmintica. Sem. car-
minativa.

FERV.

53. [MATTHIOLVS radicem tusam et ventri emplastri modo imposi-
tam ad vermes intestinorum remedium expertum affirmat.]



FERVLA.

55. *F. asa foetida*. KAEMPF. amoen. 535. t. 536.

LOC. Persia.

Perennis, peregrina.

PHARM. ASAE FOETIDAE gummi, Essentia, Sy-
rupus.

QUAL. gummi - resina, foetidissima, amaricans, acris,
orgastica alliata. *Eximia, trita.*

VIS: resolvens, carminativa, antispasmodica.

ANGELICA.

56. *A. Archangelica*. OED. DAN. t. 206.

LOC. Alpes Lapponiae, Austriae etc. et ad rivulos.
Biennis.

PHARM. ANGELICAE SATIVAE Rad. ∇ ; herba,
semina, Ω , $\bigcirc\bigcirc$, Balsamus, Extract.

QUAL. acris, amaricans, fragrans, aromatica, calida.

VIS: resolvens, stomachica.

BVBON.

57. *B. Galbanum*. JACQ. hort. 3. t. 36.

LOC. Aethiopia.


PHARM. GALBANI Gummi commune, dep. Es-
sent. $\bigcirc\bigcirc$.

C 2

QUAL.

55. [Cl. ROSENSTEIN laudando commendat pilulas ex asa foetida
eum melle pond. gr. i. formatas, pueris lumbricis laborantibus
omni trihorio N. 5. per 2. dies propinandas; interiectis vero tri-
bus diebus Rhabarbarum ad alvum ducendam interponendum
est, vid. eius libr. *von den Kinderkrankheiten* p. 516, edit. noviss.]

56. [CARTH. Fund. Mat. Med. Sect. XII. c. 8. §. 6.]



QUAL. Resina graveolens, amaricans. *Trita, praestans.*
VIS : carminativa, resolvens, antispasmodica.

CORIANDRUM.

58. *C. sativum.* BLAKW. t. 176. REGN. bot.

LOC. Italiae agri.

Annua.

PHARM. CORIANDRI semina, Confectio, $\circ\circ$.

QUAL. tetra, suspecta.

Culinaris, varior.

VIS : carminativa, hypnotica.

59. *C. testiculatum.* FLVCK. alm. 120. t. 169. f. 2.

RIV. pent. t. 72.

LOC. Europae australis agri.

Annua.

PHARM.

QUAL.

VIS.

IMPERATORIA.

60. *I. Ostruthium.* BLACKW. t. 279. REGN. bot. ZORN.
icon. t. 24.

LOC. ad radices alpium Helvetiae, Austriae, Al-
verniae.

Perennis.

PHARM. IMPERATORIAE Radix.


QUAL. amaro - acris, aromatica, calida. *Trita, praestans.*

VIS : carminativa,

PASTI-

58. [RAII hist. pl. L. IX. c. 22.]

60. [CARTHEVS. Fund. Mat. Med. Sect. XII. c. 8. § 3.]



PASTINACA.

61. P. *Opopanax*. MORIS. hist. 3. p. 315. f. 9. t. 17.

f. 2. GOUAN. illustr. bot. p. 19. t. 13. 14.

LOC. Galloprovincia, Italia, Sicilia. *Perennis.*

PHARM. OPOPANACIS Gummi.

QUAL. Gummi - resina amaricans, acris, graveolens.

Rarior.

VIS: nervina, carminativa, eccoprotica.

CARVM.

62. C. *Carvi*. JACQ. austr. t. 393.

LOC. Europae prata.

Biennis, vulgaris.

PHARM. CARVI Semina, Confectio, ∇ , Ω , $\circ\circ$.

QUAL. acris, aromatica, calida. *Culinaris, praestans.*

VIS: resolvens, carminativa.

PIMPINELLA.

63. P. *Saxifraga*. JACQ. austr. 4. t. 395. OED. DAN.
t. 669.

LOC. Europae campi.

Perennis, vulgatissima.

PHARM. PIMPINELLAE NOSTRATIS (albae) ra-
dix, Conserva, Essent. ∇ . hb. Sem.

QUAL. acerrima, hircina, calida.

Trita, praestans,


Stabliana.

VIS: resolvens, stomachica.

C 3

TRI-

61, [Vinum OPOPANACIS olim in affectibus verminosis adhibebatur
GLEDITSCH.]



TRIGINIA.

SEMECARPVS.

64. S. *Anacardium*. MURRAY Syst. veg. ed. nov. pag. 292. SUPPL. pl. p. 182.

LOC. desertae et sylvaticae aridae Indiae, versus Zeylonam.

PHARM. ANACARD. officin.

QUAL. nuclei dulcis amygd. putaminis acerrima.

Exoleta.

VIS: nuclei nutriens, putam. caustica.

SAMBVCVS.

65. S. *Ebulus*. MILL. dict. n. 4. ic. t. 226. ZORN. icon. t. 40.

LOC. Europa, Suecia, Calmaria. *Perennis, cicur.*

PHARM. Ebuli Radix, Cort. interior, Folia, Flores, Baccae, Rob, Sem.

QUAL. amaro - acris, tetra foetida, nauseosa.

Rarior, eximia, cauta.

VIS: (pellens, emetica, draftica,) herbae olei cocti anthelmintica.

CLAS-

64. [S. A. in India frequenter usurpatur adversus lumbricos. vid. GARCAS ab HORTO hist. aromat. et simpl. aliquot. Medicam. pag. 125.]

65. [LINN. amoen. acad. T. V. p. 137.]



CLASSIS VI.

HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

ALLIVM.

66. A. *Porrum*. BLAKW. t. 421. HALL. all. 6.

LOC.

Biennis, oleracea.

PHARM. PORRI semina, Mel, Syrupus.

QUAL. acris, subdulcescens, orgastica. *Exoleta, culinaris.*

VIS :

67. A. *viCTORialis*. JACQ. austr. t. 216.

LOC. Alpes Helvetiae, Italiae, Austriae, Silesiae.

Perennis, submansueta.

PHARM. VICTORIALIS LONGAE Radix.

QUAL. acris, orgastica.

Exoleta, superflua.

VIS : Allii sequentis.

68. A. *fativum*. HALL. all. 1. DODON. pemt. 682.

CAM. epit. 328.

C 4

LOC.


68. [Inter antiquiores medicos GALENVS, DIOSCORIDES, PAVL.

DE AEGINA et CELSVS Allium fativum praecipue magnis laudibus in enecandis vermibus extulerunt; inter recentiores solum

Cl. ROSENSTEINIVM attulisse sufficiat, ubi duo clara exempla enumerantur, quae eius vim vel taeniis inimicam probare videntur.

In mulsâ coctum puerisque oblatum, sive lacte decoctum et

ven-



LOC. Sicilia. *Perennis, oleracea.*

PHARM. Allii radix, ∇ , H .

QUAL. acris, subcaustica, orgastica, lactaria, urinaria.

Culinaris, praestans.

VIS: excitans, pellens.

69. A. *ascalonicum*. MORIS. hist. 2. p. 383. f. 4. t. 14
f. 3.

LOC. Palaestina.

Perennis.

PHARM. CEPAE ASCALONICAE Radix.

QUAL.

VIS:

70. A. *Cepa*. HALL. alt. 10. DODON. pempt. 687.

LOC.

Biennis, oleracea.

PHARM. CEPAE Radix.

QUAL. acris, orgastica.

Culinaris, praestans.


VIS:

ERY-

ventri superimpositum, eius saporem odoremque ingratum reformidantibus plurimum adiuventi interdum attulisse, certum est exploratumque. Russi et Turcae, qui Alliis mirum delectantur liberosque suos harum deliciarum participes facere solent, vermibus rarius infestantur. Si ascarides in pudendo muliebri nidulentur, anthelmintica pessularia commendavit HIPPOC. de Mul. morbis l. 2. c. 60.]

69. [A. A. vermes intestinorum necare afferit MATTH.]

70. [Aniculae nostrae crudam cepam conscindunt, atque in aquam fontanam iniiciunt, perque noctem in ea macerant, postea pueris et infantibus hancce aquam potandam exhibent ad eiiciendos ventris lumbricos. Neque sine fructu; sed Allium melius id efficit.]



ERYTHRONIVM.

71. E. *Dens canis.* GMEL. fib. 1. p. 39. t. 7. JACQ.
austr. V. 5. app. t. 9.

LOC. Liguria, Allobroges, Augusta Taurinorum,
Sibiria, Virginia, Monspelium. *Perennis.*

PHARM. DENTIS CANINI Radix.

QUAL.

VIS:

SCILLA

72. S. *maritima.* ZORN. icon. t. 380. BLAKW. 591.

LOC. Hispaniae, Siciliae, Syriae litora arenosa.

Perennis, submansueta.

PHARM. SCILLAE Radix, Acetum, Essentia, Oxy-
mel scilliticum.

QUAL. acris, amara, cruda corrosiva. *Trita, heroica.*

VIS: incidens, stimulans. pellens, emetica, hydra-
goga.

ALOE.


73. A. *perfoliata.* ZORN. icon. t. 283.

C 5

cl. ve-

71. [Stiriacas mulierculas radice exsiccatæ pollinem pulvis puerorum
inspergere ad enecandas eliciendasque ventris taenias CLVSIVS
relatum audivit. Id cum idoneum auctorem habeat, neque ha-
bere quicquam periculi possit, quamvis in monumentis reliquorum
medicorum non legerim, tamen inferendum huic dissertationi
meae credidi.]

73. [A. vix sola adhibetur, nisi in infantibus contra vermes, quibus
enecandis et expellendis egregie conducit. Speciebus admiscetur,
quas



α. vera. RHEED. mal. II. p. 7. t. 3.

LOC. Italia, Sicilia, Melitae tecta, muri. *Perennis, submansueta.*

PHARM. ALOES HEPATICAЕ ℥ij. lotae ℥j,
Tinet, Extr. ℥℥.

β. Aloe americana.

LOCVS: Barbados. *Perennis, submansueta.*

PHARM. ALOE SVCCOTRINA.

γ. Aloe guineensis caballina.

LOC. Guinea. *Perennis, submansueta.*

PHARM. ALOE CABALLINA.

QUAL. amarissima, nauseosa. *γ. Rara; α. β. Trita, heroica.*

VIS: purgans, pellens, stomachica.


ACORVS.

74. A. *Calamus.* ZORN. ic. t. 207. LEHRS herb. n. 260. t. 13. f. 12.

α. Acorns verus. f. Calamus aromaticus officinarum

quas *Hieras picras* medici adpellare solent; merito quidem; namque ob eius amaritiem utique vermibus infesta dici meretur; sed diligenter prospiciendum, ne gracilioribus atque etiam ad haemorrhoides vergentibus temere porrigatur, id enim frequenter usu venit, ut intestina nimium stimulando, ad haemorrhagias urgeat, quare non ultra aliquot grana semel dedisse fas est. Cum aceto et felle bovino mixta, atque umbilico imposita taenias et lumbricos exturbare dicitur.]

74. [CARTHEVS. Fund. M. M. Sect. XII. §. 3.]



narum. MORIS. hist. 3. pag. 246. f. 8. t. 13.
f. 4.

LOC. Europae paludes.

Perennis, cicur.

PHARM. CALAMI VVLGARIS radix, condita,
Extract. ▽, ♀.

β. Acorus verus f. Calamus aromaticus radice
tenuiore. RHEED. mal. II. p. 99. t. 60.

LOC. India orientalis, Brasilia. *Perennis, peregrina.*

PHARM. ACORI VERI Radix.

QUAL. aromatica, acris, amaricans, fragrans. *Vsitata,*
praeftans.

VIS: incidens, pellens, stomachica.

TRIGYNIA.

RVMEX.

75. R. *acutus*. MÜNTING brit. t. 189. BLAKW. t. 491.

LOC. Europae succulenta. *Perennis, frequens.*

PHARM. LAPATHI ACVTI Radix, herba, femina.


QUAL. styptica, nauseosa, *radicis* amarior, lutea, fo-
liorum acidior. *Praestans, Hb. superflua.*

VIS: adstringens, tonica, eccoprotica.

76. R. *alpinus*. MÜNTING phyt. t. 200. ZORN. icon.
t. 23.

LOC.

76. [In Russia infantibus et pecoribus propinatur ad eliminandos ver-
mes. PALL. it. I. p. 195.]



LOC. Europae humentia. *Perennis, frequens.*

PHARM. RHABARBARI MONACHORVM Radix.

QUAL. amaro - austerā, flava.

VIS: adstringens, sublaxans.

CLASSIS VII.

OCTANDRIA.

MONOGYNIA.

CHLORA.

77. *C. perfoliata.* MORIS. hist. 2. p. 565. t. 5. f. 26.
f. 1. 2.

LOC. Helvetia, Anglia, Gallia, Hispania, Germania, Oriens. *Annua.*


PHARM.

QUAL. amara citra mordacitatem.

VIS: leviter adstringens.

CLAS-

77. [vide RAII hist. pl. L. XX. p. 1093: GALENVS ob insignas mirasque huius plantae facultates de ea integrum librum conscripsit.]



CLASSIS VIII.

ENNEANDRIA.

MONOGYNIA.

LAVRVS.

78. L. *cinnamomum*. JACQ. amer. pict. p. 59. t. 117.

LOC. Zeylona, in America ad montem Calebasse
Martinicae. *Arbor, peregrina.*

PHARM. CINNAMOMI Cortex, Syr. ▽ sine vino,
▽ cum vino, ♀, ♂♂ Gtj.

QUAL. dulcis, dein acris, aromatica, suavissima, fra-
grantissima. *Trita, heroica.*

VIS: corroborans, carminativa, stomachica.

β. Katou - Karua. RHEED. mal. 5. p. 105. t. 53.

LOC. Malabaria. *Arbor, peregrina.*

PHARM. MALABATHRI Folium.

QUAL. acris, aromatica, fragrans, debilis.


VIS: calefaciens, stimulan.

79. L. *camphora*. COMM. hort. 1. pag. 185. t. 95.

LOC. Iaponia. *Arbor, fera.*

PHARM.

79. [vid. WEDELII Diff. de Camphora pag 22. et PRANGE Diff. de camphorae virtute anthelm. Goett. 1759. Affirmat Ill. BALDINGER, magnopere profuisse istam in affectibus verminosis, et in clysterum forma proinde cortici nupta. vid. von den Krankheiten einer Armee p. 408, et APPEND. pharm. Edinb. p. 269.]



PHARM. CAMPHORAE Refina grj — ☿, ♀, ♂.

QUAL. aromatica, acris, amaricans, fragrantissima.

Trita, heroica.

VIS: resolvens, nervina, pellens.

80. L. *nobilis*. ZORN. ic. t. 52.

LOC. Italia, Graecia.

Arbor, mansueta.

PHARM. LAVRI BACCAE, ∇, ♂, Folia.

QUAL. subacris, aromatica.

Trita, praestans.

VIS: stomachica, resolvens, pellens, carminativa, phthiriaca.

RHEVM.

81. R. *undulatum*? AMOEN. ACAD. 3. p. 212. REGN. bot.

LOC. China, Sibiria.

Perenns.

PHARM. RHABARBARI VERI Radix 3j. tosta 3ij.

(licet in hac forma minus concinna.) Essentia 3j. Extractum 3j.

QUAL. styptico-amara, nauseosa, lutea.

Trita, heroica, usitatissima.

VIS: laxans, tonica, stomachica.

CLAS-

81. [Secundum observationes Cl. PALLAS et GEORGI verosimillimum est, *Rhabarb. verum* desumi a *Rheo undulato*; nisi, ut credere fas est, *Rhabarb. verum* singularis sit species. Docente Cl. FORSTER *Rhabarb. verum* est a *Rheo palmato*. Vid. eius *Geschichte der Entdeckungen und Schiffahrten im Norden. Erst an der Oder 1784. S. 286.* Ego itaque fretus tantorum auctorum observationibus, *Rheum undulatum* inferendum esse putavi. Ex observat. Ven. RIMROD vero elucet, radicem *Rhei hybridi* maxime convenire *Rhab. vero.* vid. *Naturforscher* 18. St. p. 243.]



CLASSIS IX.

DECANDRIA.

MONOGYNIA.

DICTAMNVS.


82. *D. albus.* JACQ. austr. t. 428. MILL. ic. t. 123.
 LOC. Germania, Italia, Gallia. *Perennis.*
 PHARM. DICTAMNI ALBI radix.
 QVAL. amara. *Rarior, dubia.*
 VIS: balsamica, pellens.

RVTA.

83. *R. graveolens.* MORIS. hist. 2. p. 507. f. 5. t. 14.
 f. 3. ZORN. ic. t. 163.
 LOC. Africa, Graecia, Hetruria, Narbona. *Frutex.*
 PHARM. RVTAE HORTENSIS herba, Conserva,
 ▽, ○○, ⊖, ⊕, Semina.
 QVAL. acerrima, amara, tetra. *Trita, heroica.*
 VIS: resolvens, pellens, carminativa, phthiriaca.

MELI-

82. [De albo multum laudis tribuitur in morbo caduco, et fellis suffusione a vermibus ortum trahente. Ill. L. B. de STOERCK vires huius radices in vermibus egregias expertus est, et in libello de Flammula Iovis cap. I. publici iuris fecit. Atque idem ille auctor laudat tincturam e radice paratam, imo pulverem radices, dosi ℥j vel 3℔; eiusque vires anthelminticas praestantiores, satis explicatas se habere atque compertas, adfirmat.]



MELIA.

84. M. *Azadirachta*. RHEED. mal. 4. pag. 107. t. 52.

BREYN. ic. 21. t. 15.

LOC. India.

Arbor.

PHARM.

QUAL. *Fructus* oleosa, acris, amara.

VIS:

QVASSIA.

85. Q. *amara*. AMOEN. ACAD. 6. p. 421. t. 429.

LOC. Surinamum.

Arbor, fera.

PHARM. QVASSIAE LIGNVM.

QUAL. amarissima, inodora.

Eximia.

VIS: balsamica, tonica, stomachica.

86. Q. *Simaruba*. AVBL. Guian. 860. t. 331. 332.

LOC. Guiana Americes.

Arbor, mansueta.

PHARM. SIMARVBAE *Lignum*, Cortex 3j.

QUAL.

84. [Foliorum succus, five per os sumptus solus; aut cum vino, aut aqua, aut gallinae iusculo mixtus, five umbilico illinitus aut solus, aut cum felle taurino, aceti aut Aloes tantillo, ad omnis generis vermes expellendos perutilis fertur. Quam ob rem familiaris admodum et perquam salubris est medicina omnibus Malabaricae incolis, quoniam lumbricis valde sunt obnoxii. RAI hist. pl. p. 1545.]

85. [vid. die *Casselschen gelehrten Beyträge* de 31. Maij. et 7. Ian. 1769. et HIRSCHEL *von der Heilung der hinfallenden Sucht* etc. Mietau 1774.]

86. [Decoctum Q. *Simarubae* magnam vim lumbricorum in puero secum deportasse adfirmavit VAN DOEVEREN l. c. p. 329.]



QVAL. inodora, amaricans.

Praestans, usitata.

VIS: tonica, stomachica.

IVSSIEVA.

87. *I. suffruticosa.* RHEED. mal. 2. pag. 55. t. 49.

RVMPH. amb. 6. t. 41.

LOC. India.

PHARM.

QVAL.

VIS:

SAPONARIA.

88. *S. officinalis.* OED. DAN. t. 543.

LOC. Germania, Anglia, Gallia, Belgium. *Perennis, cicur.*

PHARM. SAPONARIAE Radix, Herba, Semina.

QVAL. amara, trita spumescens.

Exoleta.

VIS: resolvens, pellens.

CLASSIS XI.

DODECANDRIA.

MONOGYNIA.


ASARVM.

89. *A. europaeum.* OED. FL. DAN. t. 633. MILL. icon.

t. 53.

LOC.

87. [Plantae decoctum epotum lumbricis enecandis servit. RAI hist. pl. p. 1510.]



LOC. Europae nemora.

Perennis, cicur.

PHARM. ASARI Radix 3j, Extr. ʒj; Fol. N°. VI.

QUAL. amaro - acris, nauseosa.

Trita, heroica.

VIS: vomitoria, purgans.

PORTVLACA.

90. *P. oleracea.* BLAKW. t. 287.

LOC. Europa, India, Ins. Ascensionis, America.

Annua, cicur.

PHARM. PORTVLACAE Hb. sem. Conserva, Syr. ▽.

QUAL. aquosa.

Culinaris, exoleta, superflua.

VIS: Sem. anthelmintica.

TRIGPNI A.

EVPHORBIA.

91. *E. officinarum.* COMM. hort. I. p. 21. t. 21.

LOC. Africa.

PHARM. EVPHORBII Gummi.


QUAL. lactescens, acris, septica.

Rarior, cauta.

VIS: incidens, stimulans, pellens, drastica.

CLAS.

91. [*Cataputiae minoris* Semina pariter et *Esulae* radicem, si cum aliis purgantibus misceatur, ad lumbricum latum expellendum efficacem esse monet IACOB. OETHAEVS. vid. D. CLERIC hist. lumbric. c. XV. p. 439.]



CLASSIS XII.

ICOSANDRIA.

MONOGYNIA.

PVNICA.

92. *P. Granatum*. ZORN. ic. t. 270. α . *Malus punica sativa*. BAVH. pin. 438. β . *Punica fl. pleno maiore*. TOVRNEF. inst. 636.

LOC. Africa, Hispania, Italia.

PHARM. (β) BALAVSTIORVM Flores.

MALICORII Cortex.

GRANATORVM Semina, Syr.

QUAL. styptica, rubrans.

Trita, praestans.

VIS: laxans; Fl. pellens, anthelmintica.

AMYGDALVS.

93. *A. Persica*. ZORN. icon. t. 280.

LOC. Persia.

Arbor, mansueta.

PHARM. PERSICAE Flores. Syr. Nuclei, ∇ .QUAL. Amygdalae amarae. (94. β .)

Exoleta.

VIS: Amygdalae amarae.

D 2

94. A.

92. [CELS. Lib. IV. c. XVII.]

93. [Folia *A. Persicae* ob amaritiam suam, in cerevisia aut lacte decocta, aut vino infusa et pueris oblata, lumbricos interficiunt et expellunt. GALENVS trita et umbilico imposita id praestare ait; nonnulli cataplasmata ex foliis persicorum et felle tauri, in eundem finem ventri admovent. Idem efficiunt et flores et syrupus inde paratus.]



94. *A. communis*. ZORN. ic. tab. 301.

α . *A. dulcis*, putamine molliore. MILL. icon. t. 28.
f. 1.

LOC. Tripolis sepes.

Arbor, mansueta.

PHARM. AMYGDALAE DULCIS Nuclei, oblongi, $\circ\circ$.

QUAL. dulcis, sapida.

Trita, praestans.

VIS: obtundens, relaxans, nutriens.

β . *A. amara*.

LOC. Tripolis.

Arbor, mansueta.

PHARM. AMYGDALAE AMARAE Nuclei $\circ\circ$.

QUAL. amara.

Praestans, dubia.

VIS: praecedentis (α), carminativa, pellens.

PENTAGYNIA.

PYRVS.

95. *P. Malus*. BLAKW. tab. 178.

LOC. Germania.


Arbor, cicur.

PHARM. POMORVM BORSDORPHIENSIVM
Succus liquidus.

QUAL.

94. [Amygdalae amarae plerisque animantibus volatilibus et quadrupedibus commestae, mortem inferunt, ob eamque causam etiam lumbricos peremturae creduntur.]

95. [Est hoc omnibus fere pomis commune, ut succus expressus admixto paulo Croci ebibitus ventris animalia pellat, inprimis vero id ea malorum species praestare creditur, quam Latini *Melimum* sive *Mussteum* vocant.]



QUAL. acidula, esculenta, sapida.

Parcior.

VIS: tonica, subeccoprotica.

TORMENTILLA.

96. *T. erecta*. OED. FL. DAN. t. 589.

LOC. Europae pascua ficca. *Perennis, vulgatissima.*

PHARM. TORMENTILLAE Radix, Essentia, Extr.
Herba.

QUAL. styptica, rubra.

Trita, praestans.

VIS: adstringens.

P O L Y G O N I A.

GEVM.

97. *G. urbanum*. OED. FL. DAN. t. 672. MURRAY in
nov. Comm. Goett. 5. p. 33. t. 4. A.

LOC. Europae nemora. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. CARYOPHYLLATAE radix, herba.

QUAL. styptica, fragrans, antacida.


Rarior.

VIS: adstringens, pellens.

D 3

CLAS.

97. [Conf. R. BVCHHAVE obs. circa rad. Gei urb. vires etc, Hafn.
1781. 8. c. fig.]



CLASSIS XIII.

POLYANDRIA.

MONOGYNIA.

PAPAVER.

98. *P. somniferum*.. ZORN. ic. tab. 371.

α. Papaver hortense sem. nigr.

β. ——— ——— sem. albo.

LOC. Europae australioris agri.

Annua.

PHARM. PAPAVER. NIGRI Sem. Capitula, Syrup.
(Diacodium) ℥j.

ALBI Herba, Syrupus ℥vj,

Sem. ○○. Opium crudum
gr. ij, correctum, succus
inspissatus, Extractum gr. V.


Tr. cum ☩, Tr. sine ☩.

QUAL. Opii resinoso - gummosa, amara, acris, te-
tra, foetida, inflammabilis. *Trita, heroica.*

VIS: narcotica, hypnotica, antispasmodica, pare-
gorica.

CAM-

98. [Opii dos duplex esse videtur; primum quod vim stupefacientem, quam in omni animanti exserit, ipsis vermium corporibus imper-
tiat; deinde quod spasmos a vermibus relaxet; quibus relaxatis
prodeunt interdum vermes. ANT. de HAEN Tract. de verm.
intestin. p. 57. et B. L. TRALLES Vſ. opii salub. etc. Wratish.
1757. 4.]



CAMBOGIA.

99. *C. Gutta*. ZORN. ic. tab. 316. RHEED. mal. 1. p. 41. t. 24.

LOC. Malabaria, Zeylona. *Arbor, peregrina.*

PHARM. GUTTAE GUMMI Gr. 3—5. Sulphuratum Gr. xvj.

QUAL. resinosa - gummosa, lutea, opaca, nitida, insipida, inodora. *Rarior, heroica.*

VIS: drastica, hydragoga, subemetica.

CARYOPHYLLVS.

100. *C. aromaticus*. ZORN. ic. tab. 315. LINN. *Pflanzensystem*. 2. p. 50. t. 12. f. 1.

LOC. Moluccae, praesertim Ternata. *Arbor, peregrina.*

PHARM. CARYOPHYLLI AROMATICI Fructus, Tr, $\circ\circ$, Balsamus.

ANTHOPHYLLI Fructus.

QUAL. aromatica, calidissima. *Culinaris, eximia.*

ANTH. *superflua.*

VIS: tonica, stomachica.

TRIGYNIA.

DELPHINIVM.

101. *D. Staphisagria*. BLAKW. tab. 265.

LOC. Istria, Dalmatia, Calabria, Apulia, Creta, Galloprovincia. *Biennis, mansueta.*

PHARM. STAPHISAGRIAE Semina.

QUAL. amara, nauseosa. *Trita, praestans, externa.*

VIS: drastica, phthiriaca.



ACONITVM.

102. A. *Anthora*. JACQ. austr. t. 382. MILL. ic. t. 12.

Loc. Alpes Pyreneae, Helvetiae, Taurinae, Allobrogicae. *Perennis*.

PHARM. ANTHORAE Radix 3j.

QUAL. amara, acris, toxica. *Exoleta, dubia*.

VIS: purgans.

PENTAGYNIA.

NIGELLA.

103. N. *sativa*. MILL. dict. n. 3. et ic. t. 187. f. 1.

Loc. Germania, Aegyptus, Creta. *Annua, mansueta*.

PHARM. NIGELLAE Semina, $\circ\circ$.

QUAL. acris, fragrans, toxica. *Rarior*.

VIS: pellens.

HELLEBORVS.

104. H. *niger*. SCHMIDEL. ic. p. 26. t. 6. JACQ. austr. t. 201.


Loc. Alpes Apenninae, Austriae, Hetruriae.

Perennis, mansueta.

PHARM.

103. [CARTHEVS. F. M. M. Sect. XII. c. 39. §. VI.]

104. [Pulvis foliorum exsiccatum, pauca quantitate, verminantibus pueris exhibetur, vel in potu, aut iusculo, vel in ficu etc. D. de LILLE in Tractat. de palpitacione cordis p. 253. sequentem mixtionem laudat. Rec. Extr. Hellebor. nigr. $\mathfrak{z}$ j Vitriol. Martis $\mathfrak{z}$ ss solve in Aqu. Card. ben. $\mathfrak{z}$ j, adde Syrup. Violar. $\mathfrak{z}$ j. M. D. S. Infanti cochlear parvum detur ieiuno stomacho.]



PHARM. HELLEBORI NIGRI Radix ʒj, Fibrae,
Extractum ʒß.

QUAL. Rad. acris, amaricans, subnauseosa, foetida.

Trita, eximia.

VIS: purgans, pellens.

105. H. *viridis*. JACQ. austr. t. 106.

LOC. Montes Vignenses, Euganei, rel. *Perennis.*

PHARM. HELLEBORI VIRIDIS Radix.

QUAL. amarior, acrior magisque nauseosa *nigro.*

VIS: praecedenti fortior.

106. H. *foetidus*. STERB. fung. 372. t. 36. f. C.

β. Helleborus niger trifoliatus. MORIS. hist. 3.

p. 460. f. 12. T. 4. f. 7.

LOCVS: Germania, Helvetia, Gallia. *Perennis.*

PHARM. HELLEBORI foetidi Herba.

QUAL. acris, tetra.

VIS: purgans, emetica.

D 5

CLAS-

106. [Si ullum unquam remedium virtutis anthelminticae gloria floruit, certe *Helleborus foetidus* maxime floret, utpote cuius efficacia in Cleveland in propellendis vermibus satis perspicua est atque manifesta. Quem et Cel. BISSET semper sibi bene cessisse fatetur. Dosis erit foliorum recentium ʒj in decocto; quodsi vero folia siccata sumantur, gr. xv. sufficere possunt pueris 5. vel 6. annorum, duos vel tres dies continuos mane oblata. In maiori copia sumtus excitat emesin atque catharsin. Succus expressus, ope sacchari in syrupum redactus, cuius cochlear dimidium mane et vesperi infantibus 2—6 annorum propinandum, pulveri et decocto praeferendus est.]

DIDYNAMIA.

GYMNOSPERMIA.

TEVCRIVM.

107. T. *Chamaepitys*. OED. FL. DAN. t. 733.

LOC. Italiae, Galliae, Angliae, Hungariae, Helvetiae, Germaniae agri. *Annua, cicur.*

PHARM. CHAMAEPITYOS Herba.

QUAL. resinoso - aromatica, amara. *Trita, praestans.*

VIS : resolvens, pellens, tonica.

108. T. *Scordium*. OED. FL. DAN. t. 593.

LOC. Europa, Sueciae Oelandia, Gothlandia.

Herba, perennis.

PHARM. SCORDII Herba, Syrupus, Essentia, ▽.

QUAL. amara, acris, orgastica alliata, lactaria.

Trita, eximia.

VIS : tonica, antiputredinosa, resolvens, pellens.

109. T. *Chamaedrys*. CLVS. hist. i. pag. 351. t. 17.


REGN. bot.

LOC.

107. [CARTHEVS. M. M. Sect. XIII. c. XI. §. VI.]

108. [*Scordium* in pulverem tritum, saepe profuisse in affectibus verminosis testatur BARRERE Obs. anat. etc. p. 170.]

109. [CARTHEVS. F. M. M. Sect. XIII. c. XI. §. 3.]



LOC. Germania, Helvetia, Gallia. *Perennis, mansueta.*

PHARM. CHAMAEDRYOS Herba.

QUAL. spirans, amara. *Trita, praestans.*

VIS: balsamica, tonica.

SATVREIA.

110. *S. capitata.* CLVS. hist. i. p. 357.

LOC. Graecia, Creta, Baetica, Hispalis, Palaestina. *Suffrutex, ferus.*

PHARM. THYMI CRETICI Herba.

QUAL. spirans, *Thymo vulgari* fortior. *Exoleta, praestans.*

VIS: *Thymo vulgari* fortior.

HYSSOPVS.

111. *H. officinalis.* JACQ. austr. t. 254.

LOC. Austriae subalpina, Russia australis. *Suffrutex.*

PHARM. HYSSOPI Herba, Conserva, Syrupus, Essentia, ∇ , $\circ^{\circ}$, Semina.

QUAL. amaricans, nidorosa, halituenta. *Trita, praestans.*

VIS: tonica, resolvens, stomachica.


NEPETA.

112. *N. cataria.* OED. FL. DAN. t. 580.

LOC.

110. [S. C. confirmante RAIIO L. XI. c. VI. p. 520. ventris taenias, exigere valet.]

111. [CELS. lib. IV. c. XVII. pag. 238. et 239. ed. HALIER. ROSENSTEIN von den Kinderkrankheiten p. 514.]



LOC. Europae pagi, ruderata. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. NEPETAE Herba.

QUAL. hircosa felina, amara. *Exoleta, praestans.*

VIS; resolvens, pellens.

MENTHA.

113. M. *crispa*. MORIS. hist. 3. p. 367. f. 11. t. 6. f. 5.
ZORN. ic. tab. 386.

LOC. Europa. *Perennis, cicur.*

PHARM. MENTHAE CRISPAE Herba, Conserva,
Syrupus, ∇, ∩, ∞.

QUAL. amaricans, spirans. *Trita, eximia.*

VIS: resolvens, pellens.

114. M. *piperita*. KNIGG. diff. t. 1.

LOC. Anglia. *Perennis.*

PHARM. MENTHAE PIPERITAE Herba.

QUAL. praecedentis, sed acrior, cum sensu refrigerii.
Rarior, eximia.

VIS: praecedentis, sed fortior.

MARRVBIVM.


115. M. *vulgare*. ZORN. ic. t. 27.

LOC. Europae ruderata argillosa. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. MARRVBII ALBI Herba.

QUAL.

113. [CELS. l. c. p. 239. et HIQVET *Arzney und Chirurgie der Armen, teutsche Uibersezung*, 1769. p. 216. CARTHEVS. F. M. M. Sect. XII. c. XIII. §. 5.]



QVAL. graveolens, amariuscula, ingrata. *Exoleta, praestans.*

VIS: pellens.

LEONVRVS.

116. *L. cardiaca*. OED. FL. DAN. t. 627.

β. *Cardiaca crispa*. RAI hist. pl. p. 572.

LOC. Europae ruderata, pagi. *Perennis, frequens.*

PHARM. CARDIACAE Herba, ▽.

QVAL. sicca.

Exoleta, infida.

VIS: roborans.

THYMVS.

117. *T. vulgaris*. BLAKW. tab. 211.

LOC. Hispaniae montosa, saxosa, Gallia Narbonensis, ubi nulla alia planta frequentior; Sibiria.

Suffrutex, cicur.

PHARM. THYMI VVLGARIS Herba, ▽.

QVAL. aromatica, spirans.

Vsitata, praestans.

VIS: resolvens, pellens, corroborans, tonica, stomachica.

SCVTELLARIA.

118. *S. indica*. RVMPH. amb. 5. p. 459. t. 170. f. 1. 2.

LOC. China.

PHARM.


QVAL. amara.

VIS: tonica, stomachica.

ANGIO-

116. [RAI hist. pl. p. 572.]

118. [Succus expressus, vel si mavis, decoctum *Scutellariae*, pueris datum lumbricos profligat, confirmante RVMPHIO.]



ANGIOSPERMIA.

SCROPHVLARIA.

119. *S. nodosa*. GVNN. norveg. n. 732. tab. 4. f. 1—3.

LOC. Europae sepes. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. SCROPHVLARIAE FOETIDAE Radix.

QUAL. tetra, foetida, amara. *Rarior, praestans.*

VIS: repellens, carminativa, Sem. anthelmintica.

CLERODENDRVM.

120. *C. infortunatum*. RHEED. mal. 2. pag. 41. t. 25.

RVMPH. amb. 4. p. 108. t. 49.

β. *C. folio lato et acuminato*. BVRM. Zeyl. 66. t. 20.

LOC. India.

Frutex.

PHARM.

QUAL.

VIS:

CLASSIS XV.

TETRADYNAMIA.

SILIQVOSA.


SISYMBRIVM.

121. *S. Nasturtium*. OED. FL. DAN. t. 690.

LOC. Europae rivuli fontesque. *Perennis, infrequens.*

PHARM.

121. [Foliorum succus epotus lumbricos in ventre enecat. RAIL hist. pl. p. 1571.]



PHARM. NASTVRTII AQVATICI Herba, Succus

ziv. Conserva, Syrupus, ∇ , Ω .

QVAL. minus quam Cochlearia acris, orgastica.

Trita, eximia.

VIS:

122. S. SOPHIA. OED. FL. DAN. t. 528.

LOC. Europae maceriae, muri tectaque. *Annua,*
vulgaris.

PHARM. SOPHIAE Semina.

QVAL. acris, fervida.

Exoleta.

VIS: stimulan, adstringens.

ERYSIMVM.

123. E. *Alliaria*. REGN. bot. ZORN. ic. tab. 91.

LOC. Europae sepes, culta, umbrosa. *Perennis,*
vulgaris.

PHARM. ALLIARIAE Herba, Semina.

QVAL. amara, orgastica, alliata. *Exoleta, praestans.*

VIS:

124. E. *cheiranthoides*. JACQ. austr. t. 23. OED. FL. DAN.
731.

LOC. Europae arva. *Annua.*


PHARM. CAMELINAE Herba.

QVAL.

VIS:

TVR-

122. [*Sophiae semina Ctnae seminibus praestantiora esse testatur C.*
HOFFMANN.]



TVRRITIS.

125. *T. glabra.*

LOC. Europae pascua sicca aprica.

PHARM. TVRRITIDIS Herba.

QUAL. acris.

VIS:

BRASSICA.

126. *B. Eruca.* REGN. bot.

LOC. Helvetia, Austria.

Annua.

PHARM. ERVCAE Semina.

QUAL. acris, fervida, penetrans, orgastica. *Exoleta.*

VIS: incidens, resolvens.

SINAPIS.

127. *S. nigra.* BLAKW. tab. 446.

LOC. Europa.

Annua, cicur.

PHARM. SINAPEOS Semina.

QUAL. acris, orgastica.

Culinaris, trita, praeestans.

VIS: incidens, stimulans.

RAPHANVS.

128. *R. sativus.* BLAKW. tab. 81.β. *R. niger.*γ. *R. chinensis annuus oleiferus.*

LOC.


Annua.

PHARM.

125. [vid. DALE Mat. Med. p. 162.]

126. [Semen contusum ex vino potum, lumbricos interimit.]

128. [I. A. HARNISCH Select. Med. Francof. T. 11.]



PHARM. RAPHANI Radix (recens) Semina.

QUAL. aquoso - acris, orgastica. *Culinaris, exoleta.*

VIS: diluens, attenuans, mundificans, carminativa.

CLASSIS XVI.

MONADELPHIA.

DECANDRIA.

HVGONIA.

129. H. *Mystax*. RHEED. mal. 2. p. 29. t. 19.

LOC. India.

Frutex.

PHARM.

QUAL.

VIS.

CLASSIS XVII.

DIADELPHIA.

HEXANDRIA.

FVMARIA.


130. F. *officinalis*. ZORN. ic. tab. 14.

LOC. Europae agri, culta.

Annua, vulgaris.

PHARM.

129. [RAII hist. pl. Lib. XXVIII. p. 1570.]



PHARM. FVMARIAE Herba, Conserva, Syrupus,
Essentia, Extractum, ▽, Semina.

QUAL. inodora, amarissima.

VIS: tonica, corroborans, pellens, eccoprotica.

DECANDRIA.

LVPINVS.

131. L. *albus*. ZORN. ic. tab. 321.

LOC. *Annua.*

PHARM. LVPINI Semina.

QUAL. ficca, amaricans, ingrata. *Exoleta, dubia.*

VIS: flatulenta.

132. L. *varius*.

LOC. Messana, Monspelim, inter segetes. *Annua.*

PHARM.

QUAL.

VIS.

DOLICHOS.

133. D. *pruriens*. JACQ. amer. 201. t. 122. — amer.
pict. p. 99. tab. 188.

LOC. India. *Peregrina.*


PHARM.

QUAL.

VIS: mechanica.

134. D.

131. [*Lupini albi* semina interficiunt lumbricos, tum contusa et ventri
imposita, tum addito melle lincta, tum in posca pota; quin et
decoctum eorum idem praestat.]



134. *D. urens*. JACQ. amer. 202. t. 182. f. 84. —
amer. pict. p. 100. tab. 189.

LOC. America meridionalis.

Frutex.

PHARM. DOLICHI VRENTIS Lanugo.

QVAL.

VIS : praecedentis.

VICIA.

135. *V. sativa*. Cuius herbam equo oblatam plus
triginta *Ascarides* diversae magnitudinis expu-
lisse, refert Rev. GOEZ in splendido libro,
qui inscriptus est: *Versuch einer Naturge-
schichte der Eingeweidewürmer thierischer Kör-
per* etc. p. 63. An itaque credendum, suc-
cum eiusdem expressum vel lumbricos C. H.
expulsurum esse?

CICER.


136. *C. arietinum*. ZORN. ic. tab. 146.

E 2

LOC.

134. [Secundum cl. BANCROFT incolae totius Guianae, inprimis vero
servi nigritae lumbricis affliguntur, quibus nullum efficacius reme-
dium opponere solent, quam Lanuginem DOLICHI, a legumini-
bus abradendam et cum Syrupo quodam in formam Electuarii
redigendam, cuius dosis adultis est $\mathfrak{z}\text{j}$ vel plures, quovis mane
per triduum, sumto simul Rheo. Aequè tutum est ipsis infanti-
bus, dosi nimirum aetati respondente. vid. BANCROFT. *Natur-
geschichte von Guiana* p. 241.]

136. [Decoctum *ciceris arietini* lumbricos eiecit. RAIL hist. pl. lib.
xviii. p. 918.]



LOC. Inter Hispaniae, Italiae, Orientis fegetes.

Annua. subcicur.

PHARM. CICERIS semina alba, rubra.

QUAL. ficca, farinacea, subnauseosa. *Rarior, dubia.*

VIS: flatulenta, pellens.

GEOFFROYA.

137. *G. inermis*. WRIGHT in philos. transact. vol. 67.
p. 507. c. fig.

LOC. Iamaica.

Arbor, peregrina.

PHARM. GEOFFR. INERM. Cortex. Cabbage-
bark. Anglis. † Decoct. Extr. Syr.

QUAL. Recent. mucilagineo - dulcis, odor. ingrati.
Sicc. mucilag. amaricans, fere inodora.

VIS: purgans, narcotica.

GLYCYRRHIZA.

138. *G. glabra*. ZORN. ic. tab. 209.

LOC. Franconia, Gallia, Italia, Hispania.

Perennis, cicur.

PHARM. LIQVIRITIAE Radix, Succus inspissatus,
Extractum, Essentia, Syrupus, Bacilli, Tro-
chisci.


QUAL. mucilaginoso, dulcissima.

Trita, eximia.

VIS: edulcorans.

GALE-

138. [*Liquiritiae* Radicis decoctum, teste CAELIO AVRELIANO, et
idem cum melle mixtum et lacte dulci sumptum BOERHAVIVS
specificum habuit.]



GALEGA.

139. *G. officinalis*. MILL. ic. t. 137. MORIS. hist. 2.

p. 91. f. 2. t. 7. f. 9.

LOC. Hispania, Italia, Africa.

Perennis.

PHARM. GALEGAE Herba.

QVAL. subaromatica.

Rarior, dubia.

VIS:

CLASSIS XVIII.

POLYADELPHIA.

ICOSANDRIA.

CITRVS.


140. *C. medica*. REGN. bot. α . *Malus medica*. β . *Malus Limonia acida*.LOC. Asia, Media, Assyria, Persia. *Arbor, mansueta.*

E 3

PHARM.

139. [Vfus eius praecipuus est in lumbricis, quos etiam extrinsecus admota fugare existimatur. Sed rarior usus certi quidpiam ponere vetat. Estur vel herba ipsa cruda, vel cocta.]

140. [Si ascarides haerent in intestino recto, qui pueros maxime exercent, semina citri medicae dari possunt. Quorum contendantur N 12—15. et coquantur in lactis $\mathfrak{z}$ iv. Expresso decocto et adiecto paululo Sacchari bibatur haec dosis quotidie, donec ascarides alvo reddantur. LANGII misc. veritat. de reb. med. Fasc. I. Luneburg. 1774. 8. p. 85.]



PHARM. CITRI Flavedo, *Essentia de Cedro.*

Cortex, Conditus, *Essent.* ▽, ∞.

Caro, Conditae, Succus, *Conserva.*

Syrupus, Semina, Flores.

QUAL. *Flav.* aromatica, odorata vesiculis oleosis.

Pulp. acida.

Sem. amara. *Fl.* fragrans.

Trita, optima.

VIS: *Flav.* cardiaca, stomachica. *Pulp.* refrigerans.

Sem. anthelmintica. *Fl.* analeptica.

141. *C. Aurantium.* REGN. bot.

β. *Citrus Sinensis.*

LOC. India Orientalis.

Arbor, mansueta.

PHARM. NAPHAEE (Flores) *Conditae, Conserva*, ▽, ∞.

AVRANT. Folia, Poma immatura, Cortex

conditus, Syrupus, Essentia, ▽, ∞.

(Bergamotte) Flavedo, *Essentia.*

QUAL. amara, *Naph.* fragrans.

Trita, eximia.

VIS: tonica, stomachica, corroborans, pellens.

POLYANDRIA.

HYPERICVM.

142. *H. perforatum.* ZORN. tab. 31.

LOC.

141. [vid. HANNES de puero epileptico foliis aurantiorum curato.]

142. [*Hyp. perf.* praestantissimum est ad lumbricos pellendos, si flores in. sp. Vini infusi exhibeantur; id quod certa nobiliss. matronae experientia didicit T. BARTHOLIN. Aet. Med. Ann. 1671. 1672.

Obs.



LOC. Europae prata. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. HYPERICI Herba, ▽, Flores, Tr. Sem.

QUAL. balsamica, graveolens.

VIS : resolvens.

143. H. *quadrangulare*. OED. FL. DAN. 640.

LOC. Europae prata. *Perennis,*

PHARM. HYPERIC. QVADRANG. Herba, Fl. Semina.

QUAL. praecedentis.

VIS : praecedentis sed praestantior.

144. H. *Androsaemum*. BLAKW. tab. 94.

LOC. Angliae, G. Narbonensis, Italiae humida loca.

Frutex,

PHARM. HYP. ANDROSAEM. Fol. Flor. Sem.


QUAL. et VIS :

E 4

CLAS-

Obs. 40. *Hyperici* succum ad vermes necandos commendat CAMERARIUS et alii. Herbae decoctum idem efficit.]

143. [Quum *Hypericum quadrangulare* perforato viribus superius sit et praestantius, ideoque officinis nostris dignissimum, id in anthelminticorum numero putaram haberi oportere.]



CLASSIS XIX.

SYNGENESIA.

POLYGAMIA AEQUALIS.

CICHORIVM.

145. C. *Intybus*. ZORN. ic. t. 37.

LOC. Europa ad margines agrorum viarumque.

*Biennis, cicur.*PHARM. CICHORII Radix, *condita*; Herba, Syrupus, ∇ ; Flores, *Conserva*, Semina.QUAL. aquoso-amara, flavo-tinctoria, *Trita.*

VIS: aperiens, tonica.

CARDVVS.

146. C. *marianus*. REGN. bot.LOC. Italiae, Galliae, Angliae aggeres. *Annua, cicur.*PHARM. CARDVI MARIAE Herba, ∇ ; Semina.

QUAL. amara.

VIS: tonica, *Sem.* anthelmint.

CARLINA.

147. C. *acaulis*. ZORN. ic. t. 168.LOC. Italiae, Germaniae montes aprici. *Perennis, cicur.*

PHARM. CARLINAE Radix,

QUAL.

146. [CARTHEVS. M. M. Sect. IX. c. VI. §. 3.]



QUAL. graveolens, acris, amara, aromatica. *Rarior.*
 VIS: pellens, stomachica, subemetica.

SPILANTHVS.

148. S. *Acmella*. BREYN. icon. 48. t. 48. SEB. mus. 1.
 p. 19. t. 9. 10.

Loc. Zeylona. *Annua, peregrina.*

PHARM. ACMELLAE Herba, Semina.

QUAL. amara, sapore odoreque *Sigisbeckiae*. *Inusitata,*
eximia, pretiosa.

VIS: Sem. anthelmintica.

EVPATORIVM.

149. E. *cannabinum*. OED. FL. DAN. t. 745.

Loc. Europa ad aquas. *Perennis, infrequens.*

PHARM. EVPATORII Radix, Herba.

QUAL. peramara, acri-odorata. *Exoleta.*

VIS: corroborans, Rd. purgans, emetica.

SANTOLINA.

150. S. *Chamae - Cyparissus*. ZORN. ic. t. 245.

Loc. Europa australis. *Fruticulus, mansuetus.*

PHARM. SANTOLINAE Herba.

QUAL. amara, nidorosa. *Rarior, praestans.*


VIS: tonica, pellens, carminativa.

E 5

PO-

148. [*Acmellae* Semina lumbricos expellunt, DALE.]

149. [IUNKERI Mat. Med. p. 516]



POLYGAMIA SUPERFLUA.

TANACETVM.

151. *T. vulgare.* GMEL. fib. 2. p. 133. t. 65. f. 1.

α . Tanacetum vulgare luteum.

β . Tanacetum crispum.

LOC. α . Europae margines pratorum. *Perennis, cicur.*

PHARM. TANACETI α . Flores, Semina.

β . Herba, ∇ , $\circ^{\circ}$.

QUAL. amara, aromatica, luteo-tinctoria, nidorosa.

Praestans.

VIS: tonica, pellens, carminativa.

ARTEMISIA.

152. *A. Iudaica.* PLVCK. alm. 4. t. 73. f. 2.

LOC. Iudaea, Arabia, Numidia. *Exotica, perennis.*

PHARM. APSINTHII IVDAICI Fol. Fl. Sem. Essent.

QUAL. fragrans, subnauseosa, amaricans.

VIS: tonica, stomachica.

153. *A. Contra.*


LOC. Regnum Boutang Mogolis, Caramania Persiae,
Palaeftina per Alexandriam, Arabia, Numidia.

PHARM. CINAE (SANTONICI) Sem. 3j. *Confectio.*

PHARM.

152. [Fol. et summitates *Apsinth. jud.* aqua, cerevisia, vel vino infundi, sicque pueris dari possunt.]

153. [Haereo ac fluctuo animo, an non Semen *Santonici*, quo non facile quidquam dixerim me vidisse efficacius, primum omnium anthelminticorum ponam. Sane ego huic nullum facile praefero, quum



QVAL. amara.

Trita, praestans.

VIS: tonica, stomachica.

154. A. *Abrotanum*. DUHAMEL. arb. 1. p. 20. t. 4.

LOC. Syriae, Galatiae, Cappadociae, Italiae, Carniolae,
Monspeli montes aprici. *Suffruticosa, cicur.*

PHARM. ABROTANI Herba, ▽.

QVAL. amara, nidoroso-halituosa. *Rarior, praestans.*

VIS: tonica, stomachia, pellens.

155. A. *Santonica*. GMEL. fib. 2. p. 115. t. 51.

LOC. Tartaria, Persia etc.

PHARM.

QVAL. et VIS.


156. A. *campestris*. GMEL. fib. 2. p. 117. n. 102. tab.
53. f. 1. 2.

LOC. Europae campi aprici, aridi. *Perennis, vulgaris.*

PHARM.

quum eius virtutem nunquam mihi imposuisse, omni ratione confirmare possim. Sed nescio profecto, quomodo acciderit, ut Cl. SELLE in Med. Clin. p. 631. id *levioribus* anthelminticis adnumerare potuerit. Num id fortasse ab illo ideo factum est, quod Semen *Cinae* a variis Artemis. speciebus desumitur? Dari potest vel decoctum cum lacte, vel melli immersum, vel in confectione, ac nisi primis diebus vermes prodeant, laxans subiungi potest. Ego plerumque cum radice *lalappae* et *Mercurio dulci* coniunctum exhibui, ubi me nunquam fere spes fefellit. Taenia illi non cedit, nisi in larga dosi sumatur. Id autem quemque animadvertere oportet, quod iam olim ZWINGERVS observasse sibi visus est, pueros, qui non verminabant, usu huius seminis male se habere. Quare curiose prospiciendum, ne quod in largienda dosi liberalitatis vestigium appareat.]

156. [ROSENSTEIN l. c. p. 514.]



PHARM. ARTEMISIAE CAMPESTRIS Hba, Sem.
 QVAL. Sem. Cinae.
 VIS: Sem. Cinae.

157. *A. pontica*. JACQ. austr. t. 99.

LOC. Hungaria interior, Pannonia, Thracia, My-
 sia: loca aprica, arida. *Perennis*.

PHARM. APSINTHII PONTICI Herba, *Conserva*.
 QVAL. sequenti suaveolentior. *Rarior, praestans*.
 VIS: sequenti debilior.

158. *A. Apsinthium*. GMEL. fib. 2. p. 129. tab. 63.

LOC. Europae ruderata arida. *Subperennis, vulgaris*.

PHARM. APSINTHII VVLGARIS Herba, Syrupus,
Conserva, ∇ , $\curvearrowright$, $\odot$, $\ominus$ *crystall.* $\ominus$ *non*
crystall. *Essent. simpl. Extr. inspissat.*

QVAL. amarissima, nidorosa; halituenta. *Trita, eximia*.
 VIS: stomachia, pellens, resolvens.

159. *A. maritima*. I. BAVH. hist. 3. p. 178.

LOC. Europae septentrionalis litora maris. *Perennis*.


PHARM. ARTEMIS. MARIT. Herba.

QVAL. amara, suaveolens, camphorata.
 VIS:

GNA-

157. [GALENVS meth. med. lib. II. c. XVII. ampliori oratione hanc
 plantam complexus est, eiusque vires enumeravit; unde factum,
 ut *A. ponticum Galeni* adpellatum fuerit.]

159. [Cum stanno raso (seu potius granulato) et corall. rubr. specifi-
 cum Anglor. adversus Taeniam. MEAD monit. et praec. med.
 p. 67. praecipue adv. *taeniam Solium* L. utile. PALLAS nord.
Beyträge I. p. 55.]



GNAPHALIVM.

160. *G. arenarium*. OED. FL. DAN. t. 641.

LOC. Europa australior, Scania campestris.

Perennis, cicur.

PHARM. STOECHADIS CITRINAE Flores. *Vsitata.*

QUAL. flava, sicca.

VIS: exsiccans.

161. *G. stoechas*. MORIS. hist. 3. p. 401. f. 7. t. 11. f. 7.

LOC. Germania, Gallia, Hispania, Oriens; colles aridi.

PHARM.

QUAL. antecedentis.

VIS.

CONYZA.

162. *C. anthelmintica*. RHEED. mal. 2. p. 39. t. 24.

LOC. India.

Annua.

PHARM. CONYZAE ANTHELMINT. Semina.

QUAL. amara.

VIS.

TVS-

160. [*G. arenarii* flores vino decocti et poti lumbricos ventris expellant, quod TRAGUS experientia certum esse didicit. Externe in emplastro ad necandos vermes interdum adhibetur.]

161. [Flores *Gnaphalii Stoechadis* vino decocti aut macerati et poti, lumbricos fugant. RAI hist. pl. p. 291.]

162. [RETZIVS ad *Serratulam* referendam esse mavult, eo, quod flosculis foemineis caret. vid. eius fasc. I. p. 28.]



TVSSILAGO.

163. *Petasites*. BLAKW. t. 222. REGN. bot.

LOC. Germania, Belgium, Anglia, Gallia. *Perennis*,
cicur.

PHARM. PETASITIDIS Radix, Flores.

QVAL. Rad. ingrata, amara, leviter styptica. QVAL.

Rarior, Fl. superflua.

VIS:

SENECIO.

164. *S. vulgaris*. OED. FL. DAN. t. 513.

LOC. Europae culta, ruderata, succulenta. *Annua.*

PHARM.

QVAL.

VIS:

INVLA.

165. *I. Helenium*. OED. FL. DAN. t. 728.

LOC. Europa australior. *Perennis, cicur.*


PHARM. ENVLAE Radix, *Condita, Conserva, Es-*
sentia, Extractum, ∇.

QVAL.

163. [Facit ad latos lumbricos, teste RAIIO.]

164. [Ad lumbricos utilem esse verisimillimum est, siquidem Veteri-
 narii Anglicani et Hippiatri succum eius expressum equis prae-
 bent, adversus ventriculi et intestinorum vermes, *Bóts* dictos,
 quorum praesentissima pestis est. RAII hist. pl. L. VI. c. XIV.
 p. 290.]

165. [Radices *Enulae* vino decoctae, aut recentium succus vino infusus
 et potus, lumbricos et enecat et expellit. CARTHEVS. M. M.
 Sect. XII. §. 8.]



QVAL. aromatica, mucilaginosi.

Trita, praestans.

VIS: pellens, stomachica.

CHRYSANTHEMVM.

166. *C. millefoliatum*. MILL. ic. 6. t. 9.

LOC. Russiae australis campi.

Perennis.

PHARM. CHR. MILLEFOL. Semina.

QVAL. et VIS: fere *Achilleae*.

MATRICARIA.

167. *M. Parthenium*.

LOC. Europae australioris culta, ruderata.

Subperennis, cicur.

PHARM. MATRICARIAE. Herba, ∇ , $\circ^{\circ}$, Flores.

QVAL. amara, nidorosa, halituaosa. *Vsitata, praestans.*

VIS: tonica, stomachica.

168. *M. Chamomilla*. ZORN. ic. t. 139.

LOC. Europae agri, ruderata.

Annua, vulgaris.

PHARM. CHAMOMILLAE nostratis Herba, Syrupus,

∇ , $\circ^{\circ}$, caerulea. Flores $\text{z}\beta$.

QVAL. amara, odorata.


Trita, praestans.

VIS: resolvens, roborans.

ANTHE-

166. [Adhibita est cum fructu a medico quodam in Russia. Calida est, adeoque promiscue propinari non debet.]

167. [Ventris lumbricos profligat vel herba ipsa, vel succus eius expressus non secus ac *Centaurium* aut *Apsinthium*. CARTHEVS. M. M. Sect. XII. c. XIII. §. 5.]



ANTHEMIS.

169. *A. nobilis*. BLACKW. tab. 526.

LOC. Europae pascua aprica.

Annua, cicur.

PHARM. CHAMOMILLAE ROMANAE Herba,

○○, Flores, ▽ anifat.

QVAL. amara, suaveolens.

Trita, eximia.

VIS: balsamica, carminativa.

ACHILLEA.

170. *A. Ageratum*. MILL. ic. t. 10. MORIS. hist. 3.

p. 38. f. 6. f. 2.

LOC. Liburnum, Florentia, Monspelim. *Perennis.*

PHARM. AGERATI Herba, ○○.

QVAL. amara, suaveolens, aromatica. *Exoleta, superflua.*

VIS:

171. *A. Millefolium*. OED. FL. DAN. t. 737.LOC. Europae pascua prataque. *Perennis, frequens.*

PHARM. MILLEFOLII Hb. Essent. Extr. ▽, ○○.

QVAL. aromatico-odorata.

Stabliana, trita.

VIS: narcotica, tonica.

172. *A. odorata*. BARR. rar. 1116. t. 992.


LOC.

169. [CARTHEVS. M. M. Sect. XII. c. XVI. §. 6.]

170. [Felici successu oleo ipsius *Agerati* utebatur SIM. PAVILVS in verminantibus pueris, tam ut iis id propinetur, quam ut Gossypio exceptum umbilico eorum admoveatur.]

171. [CARTHEVS. M. M. Sect. XII. c. XVI. §. 10.]

172. [RAU hist, pl. Lib. VIII. c. III. p. 348.]



LOC. Helvetiae, Narbona, Hispania. *Perennis.*

PHARM.

QUAL. amara,

VIS.

POLYGAMIA FRVSTRANEA.

CENTAVREA.

173. *C. benedicta.* ZORN. ic. t. 122.

LOC. Agri in Chio, Lemno, Hispania. *Annua.*

PHARM. CARDVI BENEDICTI Herba, Conserva,

▽, ✚, Flores, Semina.

QUAL. amarissima.

Vsitata, praestans,

VIS: tonica, pellens, purgans, subemetica.

CLASSIS XX.

GYNANDRIA.

HEXANDRIA.

ARISTOLOCHIA.

174. *A. Serpentaria.* CATESB. car. I. p. 29. t. 29.


LOC. Virginia, Carolina.

Perennis, mansueta.

PHARM.

173. [CARTHEVS M. M. Sect. IX. c. VI. §. III.]

174. [CARTHEVS. M. M. Sect. XII. c. VII. §. 3.]



PHARM. SERPENTARIAE VIRGINIANAE Radix
3ß Essentia.

QUAL. acris, hircosa, odore Valerianae. *Trita, eximia.*

VIS: pellens.

175. A. *Pistolochia*. CLVS. hist. 2. p. 72.

Loc. Hispania, G. Narbonensis, Helvetia. *Perenn.*

PHARM. A. PISTOLOCHIAE Radix.

QUAL. convenit cum Serpentaria.

VIS: antecedentis.

176. A. *rotunda*. ZORN. ic. tab. 125.

Loc. Italia, Hispania, G. Narbonensis. *Perennis,
mansueta.*

PHARM. ARISTOLOCHIAE ROTVNDAE Radix.

QUAL. foetida, aromatica, acris, exurens. *Vsitata,
praeftans.*

VIS: incidens, pellens, emetica.

177. A. *longa*. ZORN. ic. tab. 201.

Loc. Gallia australis.


PHARM. ARISTOLOCHIAE LONGAE Radix.

QUAL. praecedentis.

VIS: praecedentis.

CLAS.

176. [*A. rotunda* ob insignem amaritiem merito anthelminticis ad-
scenda videtur.]




CLASSIS XXI.



MONOECIA.

TETRANDRIA.

BETVLA.

178. B. *alba*. BLAKW. tab. 240.Loc. Europae sylvae. *Arbor, frequentissima.*PHARM. BETVLAE Lignum, Lympha, Epidermis,
Folia tenera, adulta, Fuligo, Carbones,
Oleum moscoviticum.QUAL. *Lymphae* edulcorans,  suaveolens. *Vsitata,*
*praeestans.*VIS: *Fol.* sudorifera; *Lymphae* diluens, anthelm. Car-
bon. anthelm.


BVXVS.

179. B. *sempervirens*, ZORN. ic. tab. 181.*α.* B. *arborescens*.*β.* *suffruticosa*.Loc. Gallia, Helvetia. *Arbor, mansueta.*PHARM. BVXI Lignum,  Gtt. xx.QUAL. *tetra*, foetida, amara. *Rarior.*VIS: *Lign.* diaphor. mundificans. *Fol.* purgans, pellens,
 anthelmintica.

F 2

MO-

178. [OLAFSEN und POVELSENS *Reise in Island I. Th.* p. 113. Ali-
is carbones eundem effectum monstraverunt PALL. *nord. Beytr. I.*
p. 57. vid. *Fraxinus* etc.]



MORVS.

180. *M. nigra*. ZORN. ic. tab. 173.

LOC. Italiae maritima, in Persia sponte. *Arbor, mansueta.*

PHARM. MORI Roob. Syrup. Cortex, Radix.

QUAL. dulci - subacida. *Trita, eximia.*

VIS: refrigerans, corroborans.

181. *M. alba*. DOD. pempt. p. 810.

LOC. China, Persia sponte. *Arbor, mansueta.*

PHARM. MORI ALBAE radix.

QUAL. amara.

VIS: purgans.

POLYPANDRIA.


IVGLANS.

182. *I. regia*. BLAKW. tab. 247.

LOC.

180. [Cortex radicis *Mori nigrae*, dosi ℥ijss , in aqu. font. ℥vj per semihoram coctus, et decoctus mane propinatus, revera Taeniam pellere dicitur. Quodsi vero unica dosis non sufficiat, iteranda est, usque dum Taenia eiiciatur. ANDRY l. c, p. 172.]

182. Nuces iuglandes egregia vi vermifuga praeditae sunt. Cl. FISCHER in Comment. phys. med. de vermib. in C. H. et anthelmintico, Stadae 1751. extractum eius parari iubet. Cuius drachmas duas in uncia dimidia aquae cinamomi s. vino solvuntur, huiusque solutionis infantibus duorum aut trium annorum guttas viginti vel triginta ter de die porriguntur. Interiectis sex vel octo diebus Laxans mercuriale subiungendum esse docet. Iuglandes aridae comestae taenias adeo certe Mediolanensibus eiiciunt, ut nihil praestantius teste BEREHS. Decoctum foliorum item vermibus inimicum creditur.]



LOC. America septentrionalis, Persia. *Arbor, mansuet.*

PHARM. IVGLANDIS fructus immaturi, Extra-
ctum, Roob.

QUAL. graveolens, amaricans, denigrans.

Rarior, praestans.

VIS: pellens.

ADELPHIA.

PINVS.

183. P. *sylvestris*. TREW in nov. act. A. N. C. III. app.
p. 452. t. 15. f. 1. 3. t. 16. f. 11—25.

LOC. Europae borealis sylvae glareosae.

Arbor, frequentissima.

PHARM. PINI Liber, Turiones, Resina, Pix, $\circ\circ$
piceis, TEREBINTHINA COMMVN. cocta,
 Ω , $\circ\circ$ Templinum.

QUAL. resinosa.

Trita, praestans.

VIS: mundificans.

CROTON.

184. *Tiglium*. RHEED. mal. 2. p. 61. t. 75.

LOC. Zeylona.

Arbustula, peregrina.

PHARM. TIGLII (Tilli) Grana. Gr. iij.


PAVANAE Lignum.

F 3

QUAL.

183. [BARTHOLINI Epist. med. T. II. Cent. IV. epist. LIV. pag. 345.
ROSENSTEIN l. c. p. 514.]

184. [ACTA PHYS. MED. Vol. IX. obs. 13. p. 34. sq. Anne Iatro-
phae *Curcas* et *multifidae* semina ob vim eius drasticam anthelmin-
ticiis adnumerari possunt?]



QVAL. *Radic. inprimis Corticis illius, Ligni recent.*

Foliorum (quae licet ceteris partibus debiliora, delibata linguam vellicant et adurunt) *Granorum* nauseosa, acerrima. *Exoleta, cauta, superflua.*

VIS: emetica, drastica.

RICINVS.

185. *R. communis.* MILL. icon. 219.

LOC. temperatum coelum IV. orbis partium.

Annua, mansueta.

PHARM. RICINI VVLGARIS (cataputiae maioris)

Semina gr. xxv. (Palmae Christi Ol.)

QVAL. succ. acris, amara; cotyledon. subadstringens, oleosa. *Exoleta, cauta.*

VIS: drastica. *Folior.* purgans; *Ol.* laxans, anthelmintica.

HIPPOMANE.

186. *H. Mancinella.* CATESB. car. 1. p. 95. T. 95.

LOC. Litora inf. Caribaearum et vicinae continentis Americae. *Arbor, peregrina.*

PHARM. LAC FICVS. (Lait du Figuier.) SVCCVS


RECENS. Dosis cochl. 1—5 vel 6.

QVAL. succus lacteus amaricans.

VIS:

185. [HVNGERBYHLERI Diff. de oleo Ricini medicam. purgante et anthelm. etc. Friburgi Brisgoviae 1780.]

186. [Est specificum anthelminticum Cayennense Cel. BAION. Journal des Médecins tom. 34. p. 60. Datur vel solum, vel cum O°O ricini, aliisque mucilaginosi oleosis. Etiam cum Simarouba. Sed deleterium medicamentum esse recte monet Cel. AVBLET in hist. des pl. de la Guiane p. 385.]



VIS: vesicans, excorians, inflammans, corrodens, venenatissima.

SPNGENESIA.

CVCVMIS.

187. *C. colocynthis*. SABBAT. hort. I. t. 70.

LOC. Syria, Alepo. *Perennis, mansueta.*

PHARM. COLOCYNTHIDIS Pulpa, Semina, Refina, Extract. gr. iv.

QUAL. amarissima, nauseosa. *Rarior, heroica, cauta.*

VIS: draastica.

BRYONIA.

188. *B. alba*. OED. FL. DAN. t. 813.

LOC. Europa ad pagos et sepes. *Perennis, infrequens.*

PHARM. BRYONIAE Rad. ʒj. Extr. ʒj. Foecula, Baccae, Semina.

QUAL. Rad. recent. turion. acris, amara, nauseosa, substyptica, baccarum mitior. *Vsitata, eximia.*

VIS: purgans, pellens.

189. *B. dioica*. JACQ. austr. t. 199. MILL. ic. 71.

LOC. Europa ad pagos et sepes. *Perennis.*

Locvs: BRYONIAE DIOICAE Radix.

QUAL. praecedentis sed praestantior.

VIS: — — —

187. [Quondam ad vermes pellendos umbilicus illinebatur unguento ex oleo diacolocynth. et felle taurino parato.]



CLASSIS XXII.

DIOECIA.

DIANDRIA.

SALIX.

190. *S. fragilis*. LINN. flor. lapp. T. 8. f. b.

LOC. Europae borealia.

Arbor, vulgaris.

PHRAM. SALICIS FRAGILIS Cortex.

QUAL. amara, substyptica.

VIS: tonica.

TETRANDRIA.

VISCUM.

191. *V. album*. BLAKW. t. 284.

LOC. Europae arbores gummosae resinosaeque.

*Frutex, parasiticus, infrequens.*PHARM. VISCII Lignum, $\circ\circ$ (heraclinum).

QUAL. graveolens.

Rarior, praestans.

VIS:

MYRICA.

192. *M. Gale* OED. FL. DAN. t. 327. ZORN. t. 217.

LOC.

190. [HIRSCHEL l. c. p. 111 sqq. et GERHARDT mat. med. p. 303—
302. Salicis cortex e *Salice alba* et *pentandra* quoque desumi
potest.]

192. [Folia *Myrti brabanticae* lumbricos necare DALE adserit.]



LOC. Europae, Americae septentrionalis uliginosa.

Frutex, vulgaris.

PHARM. MYRTI BRABANTICAE Folia.

QUAL. amara, nidorosa, luteo-tinctoria, cerifera.

Exoleta praestans.

VIS: phantastica, narcotica.

PENTANDRIA.

CANNABIS.

193. *C. sativa.* MILL. icon. t. 77.

LOC. Iaponia, India orientalis.

Annua, cicur.

PHARM. CANNABIS Semina, Ol.

QUAL. virosa.

Rarior, praestans.

VIS: narcotica, anodyna.

HVMVLVS.

194. *H. Lupulus.* BLAKW. t. 536. a. et b. REGN. bot.

LOC. Europae sepes et ad radices montium.

Perennis, cicur.

PHARM. LVPVLI coni.

QUAL. amara, nidorosa.


Rarior.

VIS: tonica, narcotica.

MONA-

193. [*Cannabis* herbae succus, nec non feminis certa pernicies est vermibus interaneis, confirmante Rajo. Emulsionem e *Cannabis* feminibus laudat ANDRY l. c.]

194. [ACTA N. C. MISC. D. II. A. VII. obs. 240. ubi cineres farmentorum lupuli adversus vermes commendantur. MATHIOLVS laudat eius semina.]



MONADELPHIA.

IVNIPERVS.

195. I. *Sabina*. BLAKW. t. 214.

LOC. Lusitania, Italia, Sibiria, Oriens Olympus,
Ararat. *Arbuscula.*

PHARM. SABINAE Herba, Extr. Essent. ▽, ∞.

QUAL. amaricans, hircosa. *Trita, praestans.*

VIS.

196. I. *communis*. BLAKW. t. 187.

LOC. Europae frigidioris sylvae. *Arbuscula, vul-
gatissima.*

PHARM. IVNIPERI Lign, Cineres, Baccae, Rob.

▽, ∞, ∞.

QUAL. aromatica, resinosa.


Trita, praestans.

VIS: pellens, carminativa.

CLAS-

195. [*Iuniperus Sabina* ingreditur specificum cel. RATHIER adversus
taeniam, quod constat e pulv. Sabin. gr. XX. Sem *Rutae* gr. XV.
Merc. dulc. gr. X. ol. *Tanac.* gtt. XII. M. f. c. Syr. fl. pers. bol.
in 2. p. div. et altera mane, altera vesperi sumenda, hausto dein
cyatho vini, in quo nuclei persicor. per XII. h. macerati fuerunt.
IOURN. de MEDECIN tom. 28. p. 44.]

196. [Decoctum summitatum *Iuniperi* comm. vel etiam succum expres-
sum equis verminantibus medici equarii exhibere solent. Olei
eiusdem guttulae duae vel tres puerulis datae lumbricos, quibus
conficiantur, occidunt, extruduntque. Gummi iuniperinum idem
praestat.]



CLASSIS XXIII.

POLYGAMIA.

MONOECIA.

VERATRUM.

197. *V. album*. JACQ. austr. t. 335. MILL. icon. t. 271.

LOC. Russia, Sibiria, Austria, Helvetia, Italia,
Graecia in montosis. *Perennis.*

PHARM. HELLEBORI ALBI Radix gr. vij.

QUAL. acris, nauseosa.

Exoleta, cauta.

VIS: draastica, emetica.

198. *V. Sabadilla*.

LOC. Mexico.

PHARM. SABADILLI Semina.

QUAL. acris, amara, caustica.

VIS: draastica, vomitoria, phthiriaca, toxica.

ANDROPOGON.

199. *A. Nardus*. RVMPH. amb. 4. p. 22. t. 6?

LOC. Zeylona.

Perennis, peregrina, dubia.

PHARM.

197. [In Russia radix recens ad pond. ℥j cum melle datur ad expellendos lumbricos et taenias. PALL. Reise I. p. 50]

198. [SCHMUCKERS *vermischte Schriften* ater B. pag. 241.]



PHARM. SPICAE (INDICAE) NARDI Radix.

QUAL. fragrans, acris, aromatica, amara.

Eximia, inusitata.

VIS: stomachica.

D I O E C I A.

FRAXINVS.

200. F. *excelsior*. BLAKW. t. 328.

LOC. Europae sepes.

Arbor, vulgaris.

PHARM. FRAXINI Lign. $\ominus$, Cortex, Folia, Sem.
Carbones.


QUAL. Cort. amara, Sem. aromatica, singularis. Car-
bonum mechanica.

VIS: Cort. adstringens; Sem. siccans; Sal. diureticae
Carbonum anthelmintica.



CLAS.

200. [Carbones *Fraxini* compositionem specifici HERRENSCHWAN-
DII adversus taeniam, adfirmante Ill. VOGELIO, praecipue in-
grediuntur; quamquam huius specifici compositio varie ab aucto-
ribus traditur. *Fraxini* carbones irritant intestina et vermes per
inde ac *Dolichos pruriens* et *urens*.]



CLASSIS XXIV.

CRYPTOGAMIA.

FILICES.

PTERIS.

201. *P. aquilina.* BLAKW. t. 325.

LOC. Europae sylvae, praesertim caeduae.

PHARM.

QVAL. resinosa, nauseosa.

VIS : incidens, tonica, eccoprotica.

POLYPODIVM.

202. *P. Filix mas.* BLAKW. t. 325.

LOC. Europae sylvae.


Perennis, vulgaris.

PHARM. FILICIS Radix.

QVAL.

201. [THEOPHRAST. Hist. pl. IX. 20. p. 193. ed. Heins. DIO-
SCOR. l. IV. c. 196. 187. PLIN. l. XXVII. p. 430. ed. Hardouin.
RAIVS, HALLERVS aliique laudes ad Pteridis aquilinae radi-
ces circumcidendas esse putant. Non defuerunt tamen, qui ra-
dicem *Pteridis aquilinae* Filici mari praetulerint.]

202. [Basis est specifici NVFFERIANI et HERRENSCHWANDIANI,
de quibus conferri meretur Ill. PALLAS in libro : *Nordische Bey-
träge I.* p. 67 sqq. quo teste utrumque Taeniam latam promte, re-
liquas autem aegrius expellere solet. Exstant tamen observatio-
nes, quae docent, radicem *Filicis maris* Taeniam Solium L. ex-
turbasse. Conf. Cel. GMELINI Confid. general. Filicum. Erlangae
1784.]



QVAL. amarulenta.

Usitata.

VIS: tonica.

203. P. *Filix foemina*. MORIS. hist. 3. pag. 579. f. 14.
t. 3. f. 8.

LOC. Europae frigidiora subhumida.

PHARM. FILICIS FOEM. radix.

QVAL. praecedentis.

VIS: praecedentis.

ALGAE.

LICHEN.

204. L. *aphthosus*. OED. FL. DAN. t. 767. f. 1.

LOC. Europae iuniperata.

Vulgaris.

PHARM. MVSCI CVMATILIS Herba.

QVAL. tetra, mephitica.

Inusitata.


VIS: draftica.

FVCVS.

205. F. *Helmintochoitos*. BARRELIER N. 1337. Icon.
1391. n. 13.

LOC.

205. [Quicumque plura de utilitate ac praestantia huius helmintagogi legere cupiat, evolvat P. I. SCHWANDIMANNI Diss. inaug. *Helmintochoitos* hist. nat. atque vires sistentem, Argentorati. 4. 1780. ubi omnia optime explicantur. Nos profecto ex omnibus, quae lumbricos expellunt, maxime singularem virtutem habere deprehendimus, ita, ut illum vix unquam spem fefellisse liquido adfirmare possimus. Solemnis nobis haec formula fuit: Rec. *Helmintochoit.* ℥ij Coq. in Aqu. fontan. ℥iv Col. adde Mellis despum. ℥℔. Omni bihorio cochleare sumendum. Hausta hac medicina vermes plerumque sine ullo purgante subiuncto exierunt.]



LOC. Corsicae insula, litora maritima Aiacii, meridionalis Galliae orae.

PHARM. HELMINTOCHORTOS.

QUAL. nauseosa, penetrans, mucilaginosae.

Trita, praestans.

VIS.

CORALLINA.

206. C *officinalis*. ELLIS. cor. 48. n. 2. 3. 4. t. 24. f. 2.

LOC. Mare Atlanticum, Norvegicum. *Mansueta.*

PHARM. CORALLINA.

QUAL. insipida, inodora, calcaria.

Frequens.

VIS: absorbens, subadstringens.

F V N G I.

BOLETUS.

207. B. *Laricis*. JACQ. misc. 1. p. 172. tab. 20. 21.

LOC. Alpium Tridentinarum, Tyrolis, Helvetiae, Delphinatus (Russiae, Sibiriae) Larices.

Peregrinus.

PHARM. AGARICI OPTIMI ʒʒ, Refina, (Extractum) ʒij.


QUAL. subdulcis, mox amara, acris, nauseosa,

Trita, eximia.

VIS: subadstringens, eccoprotica.

APPEN-

206. [Verosimile est, *Corallinas* ad regnum vegetabile referendas esse. Conf. Ill. PALLAS Elench. Zoophytorum. Poterit itaque haec in numerum anthelminticorum vegetabilium recipi. VAN SWI- TEN Comment T. IV. p. 727.]



APPENDIX.

PALMAE.

COCOS.

208. *C. nucifera*. JACQ. amer. 277. t. 169. — pict. p. 135.

LOC. Indiae paludosa, umbrosa.

PHARM.

QUAL.

VIS :

RESINAE.

209. MYRRHA.

LOC. Regio Troglodytarum Africae. *Barbara.*

PHARM. MYRRHAE Gummi - refina ℥j, ℞, 3℔,

• Extr. O°O destil. et O°O per Deliquium.

QUAL. ruffa, amara, subacris, aromatica, nauseosa,
graveolens. *Trita, eximia.*

VIS : tonica, stomachica.

210. SAGAPENVUM.

LOC. Alexandria, Persia.

Barbara.

PHARM. SAGAPENI Gummi - refina.

QUAL. virofa, acris, rufescens.

VIS : eccoprotica, resolvens.

MI.

208. [E nucleis contusis atque expressis lac extorquetur, lumbricis encandis utilissimum teste DALE.]

209. [CARTHEVS. M.M. Sect. XII. c. XXVIII. §. 15. *Aloen, Crocum* et *Myrrham* sumebat BOERHAVE Chem. Tom. II. Process. 81. p. 277. Laudat hoc remedium, quoties in primis viis lumbrici hospitantur. VAN SWITEN egregie hoc profuisse testatur.]

MISCELLANEA.

211. AGALLOCHVM. RVMPH. amb. 2. t. 9.

LOC. China.

Arbor, peregrina.

PHARM. ALOES (Agallochi veri) Lignum ꝑj. Resina, o^oc.

QUAL. lactescens, medullium trunci amarissimum.

Rarior.

VIS: venenatissima, excorians.

212. SPONGIA FLUVIATILIS.

QUAL. aspera, tetra.


VIS: irritans (mechanice) vermes et intestina.

THE-

212. [Datur in Russia adversus vermes, GMEL. I. p. 150. Num genuina sit *Spongiae* species, dubitari adhuc potest. Certe non est animal, cum vitae nullum in ea reperiatur vestigium. PALL. elench. Zooph. p. 384.]

CORRIGENDA.


In Praef. p. 12. l. 3. infimul l. simul. N. 1. l. 2. Perernis l. Perennis.
N. 6. l. 5. debilis l. debile. N. 7. l. 1. LEHRS l. LEHR. N. 46.
ECHYTES l. ECHITES. N. 50. t. 76. l. f. 76. Pag. 44. Cl. VII. l.
Cl. VIII. Pag. 45. Cl. VIII. l. IX. Pag. 47. Cl. IX. l. X. N. 83.
not. 83. De l. D.



THESES.

- I. Thea roborat.*
- II. Nulla febris per se lethifera.*
- III. Non dantur signa pathognomonica, vermium praesentiam indicantia.*
- IV. Vroscopia aequae vana est, ac Chiromantia.*
- V. Omnia roborantia sunt adstringentia.*
- VI. Miliaria perversae curationis sunt pedissequae.*
- VII. De medicis quoque dici potest, eos iura vitae et necis habere.*
- VIII. Non omnis curatio cito, tuto et iucunde peragi potest.*
- IX. In scholis medicorum auctoritates non valent.*
- X. Munditiei quam maxime studiosus sit medicus, neque vero odoribus placere cupiat, sed nec foetore molestus sit.*





Schaeffer, Johann.

<<Diss. inaug. med. sistens>> anthelmintica regni vegetabilis

Altdorfium 1784

Diss. 761,2

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10841935-8

VD18 15141799-001